

일반의약품 **조제용**

콘드로이틴 800mg 함유

콘드로친정

작성일 : 2024년 05월 10일

콘드로이틴 800mg 함유

콘드로친정

일반의약품

조제용

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 800mg
티아민질산염(KP) 25mg
콜레칼시페롤과립(별규) 10mg
(비타민 D로서 1000 I.U.)
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 코포비돈, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭실드 분홍색 29P735, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

【성상】

연한 분홍색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음경우의 비타민 D, B1의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민 D(콜레칼시페롤과립)
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
 - 비타민B1(티아민질산염)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통(허리), 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의피로

【용법·용량】

만 19세 이상의 성인 : 1일 1회, 1회 1정

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 신장결석 환자
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
 - 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 식욕부진, 흥분(붉은 반점), 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기), 부종(부기)·수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
 - 우발적으로 과량복용 한 경우

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

30정/병, 60정/상자(30정/병X2)

【사용기한】

외부포장 참조

【제조자】

(주)마더스제약 / 전북특별자치도 익산시 삼기면 산단오룡길 38 마더스제약 제2공장

【판매자】

(주)아모스팜 / 대전광역시 유성구 지족로 148번길 39-15

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 작성일자(2024. 05. 10) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목 허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2024년 05월 10일

CDR-2405-00

40년 이상 엄마의 마음으로
여러분의 건강을 지켜온



(주)마더스제약 Since1974-
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



AMOS PHARMA

>> 접지 후 모습

일반의약품 **조제용**

콘드로이틴 800mg 함유

콘드로친정

작성일 : 2024년 05월 10일

• 롤 풀림방향 (미출) →

날짜	2024년 5월 20일	기타	롤타입	●재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ●전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ●빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ●같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님의에서 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다. ※ 수정된 원본 데이터는 제공되지 않습니다.
고객사	마더스제약	색상	먹색(K100) —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)	
제품명	콘드로친정			
유형	매뉴얼팩			
인쇄	□양면 □단면			
규격	138×245mm			
접지규격	35×35mm	폰트	－ 제품명 : 7포인트 이상 － 일반의약품 문구 : 7포인트 이상 － 본문 : 7포인트	
재질	캠퍼스지 50g			
관리번호	2024. 05. 10 / CDR-2405-00			