

140 × 200

일반의약품

고함량 마그네슘 복합제

마그원매코정

손발저림, 어깨·목결림
구내염, 구순염, 혈행장애

【원료약품 및 그 분량】 1정(1,234mg) 중

■ 유효성분

산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 250mg) 414.53mg

리보플라빈(KP) 20mg

메코발라민(KP) 1000μg

셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 27μg) 50mg

피리독신염산염(KP) 20mg

토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민E로서 100 아이.유) 200mg

감마-오리자놀(KP) 5mg

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭실드칼색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】

갈색의 장방형 필름코팅정

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용합니다.

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민(E, B₂, B₆)의 보급

- 육체피로
- 임신, 수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 4) 심장·순환기계 기능 장애 환자
- 5) 신장(콩팥)장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 임부
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

Kwangdong

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 우발적으로 과량 복용한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 일반적인 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (만약, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)
※ 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 소비자 상담전화(080-700-0178) 또는 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(<https://ne-drug.mfds.go.kr/searchDrug>)을 통해 확인할 수 있습니다.
※ 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
※ 의약품 사용 후 부작용 발생시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약품안전관리원에 할 수 있습니다.
신장방범 ☎ 1644-6223, 14-3330 | ☒ karp.drugsafe.or.kr
신장대성 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족
보상범위 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

MAG-2411-01

작성(개정)연월일 : 2024.11.12

【판매자】

광동

서울특별시 서초구 서초대로 50길 94, 5층

【제조자】

메딕스제약
MEDIX PHARM. CO., LTD.

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

【제조의뢰자】

아이큐어(주)
Pharmaceuticals & Cosmetics

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 248

MEDIX PHARM. CO., LTD.

ICURE PHARM. INC.