

프로젝트 시방서

자재명	프리스담정_10T_케이스
규격(장폭고/두께)(mm)	65x18x108mm
인쇄도수	4도[CMYK]
용지/코팅/후가공	CCP300g / 부분UV코팅(접착면 코팅 제외)

CMG 제약



프리스담정

일반의약품

10정

프리스담정

⚡ 어깨 결림

⚡ 신경통

⚡ 허리 통증

씨엠지제약

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(www.mfds.go.kr) 또는 031-314-0329 소비자상담실에서 확인하실 수 있습니다.
※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국소비자원(1644-6223)에 할 수 있습니다.
※ 문헌개정일 : 2024. 06. 26 (Rev.)

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

[유효성분]	1정 중
클로로콕사존(KP)	150mg
에텐자미드(KP)	150mg
카페인수화물(KP)	25mg(카페인으로서 22.87mg)

[성상]	흰색의 원형 필름코팅정
[효능·효과]	신경통, 요통(허리통), 어깨결림
[용법·용량]	성인 1회 1~2정 1일 2회 등통증 또는 발작시에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오. 1) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기 접촉성 피부염 기관지천식 알레르기성 비염 관절염 편두통 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 2) 지금까지 약에 알레르기 증상에 : 발열 발진 관절통 천식 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 경우(약에 유아 및 어린이 (14세 이하) 4) 간질 신경공통, 감성불안, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 고령자 노인, 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오. 1) 음란, 음탕을 잘 지킵시오 2) 다음 약들과 동시에 복용하지마시오. - 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등 3) 어린이에게 복용시 잘 경우는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시키시오
- 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오. 1) 복용하는 동안 발진 발적출혈등이 볼 어짐, 구역 구토 변비 식욕부진 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 2) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 3) 장기 연용(계속 복용)하지마시오
- 보관 및 취급상의 주의 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 통풍이 잘 되는 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 오용잘못 사용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지마시오.

[저장방법] ■ 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 ■ 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

[사용기한] ■ 용기 하단 표기일까지

[첨가제]

■ 기타 첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 이질성셀룰로오스, 전분, 폴리비닐피롤리돈, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 산화티탄, 락트, 폴리에틸렌글리콜6000

제조번호 :

사용기한 :