전문의약품 2024. 05. 02
트립엠듀오정
2.5/500mg, 2.5/850mg, 2.5/1000mg
(리나글립틴 / 메트포르민)

제2형 당뇨병 치료제

트립엠듀오정 2.5/500mg, 2.5/850mg, 2.5/1000mg

전문의약품

(리나글립틴 / 메트포르민)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

[트립엠듀오정2.5/500밀리그램(리나글립틴, 메트포르민)]

* 유효성분 : 리나글립틴벤질산염(중청구) ---- 3.34 mg
(리나글립틴으로서 2.5 mg)
메트포르민염산염(USP) ---- 500 mg
* 기타첨가제 : [illegible]

[트립엠듀오정2.5/850밀리그램(리나글립틴, 메트포르민)]

* 유효성분 : 리나글립틴벤질산염(중청구) ---- 3.34 mg
(리나글립틴으로서 2.5 mg)
메트포르민염산염(USP) ---- 850 mg
* 기타첨가제 : [illegible]

[트립엠듀오정2.5/1000밀리그램(리나글립틴, 메트포르민)]

* 유효성분 : 리나글립틴벤질산염(중청구) ---- 3.34 mg
(리나글립틴으로서 2.5 mg)
메트포르민염산염(USP) ---- 1000 mg
* 기타첨가제 : [illegible]

[성상]

트립엠듀오정2.5/500밀리그램(리나글립틴, 메트포르민) : [illegible] 필름코팅정제

트립엠듀오정2.5/850밀리그램(리나글립틴, 메트포르민) : [illegible] 필름코팅정제

트립엠듀오정2.5/1000밀리그램(리나글립틴, 메트포르민) : [illegible] 필름코팅정제

[효능·효과]

이 약은 리나글립틴과 메트포르민의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.

[용법·용량]

[트립엠듀오정2.5/500밀리그램(리나글립틴, 메트포르민)]

[illegible]

[사용상의 주의사항]

[illegible]

[저장방법] [illegible]

[포장단위] 30정/병, 60정/병

[사용기한] 외부포장참조

[제조자] (주)마더스제약 / [illegible]

[illegible]

※ [illegible]

※ [illegible] (https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2024년 05월 02일

40년 이상 엄마의 마음으로
여러분의 건강을 지켜온

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.