

CHO-A PHARM.CO.,LTD.		DESIGN TEAM
제 품 명 : [신규/위수탁] 에카슬림정 500T		
포 장 형 태 : 라벨스티커 (롤라벨, 모서리:라운드처리, 폴립방향:두출)		
규 격 : 200 (가로) × 75 (세로) mm		
재 질 : 아트스티커지 - 제조처 기준 사양		
코팅 : 제조처 기준 사양		
색상 및 인쇄 : 별색 2도(먹, 분홍 - PANTONE 806 C) / 옴셋인쇄		
인쇄색상기준 : ☐ 기 지정표준안 ☐ 교정지 ☐ 현장감리 ☒ 기타 별색에 맞게 인쇄		
전송처 : 노바엘헬스케어		작업일자 : 2024. 05. 23
		작업자 : 엄경덕 과장

일반의약품 | 조제용

에카슬림정 500정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 아세트아미노펜(KP) 200.00 mg, 에페드린염산염(KP) 25.00 mg, 카페인무수물 (KP) 25.00 mg
- 첨가제(타르색소) : 적색3호
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능 및 효과】 감기의 증상상(여러증상)(인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 및 용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1정 식후 30분에 복용

【성상】 분홍색의 원형 정제

【사용상의 주의사항】

1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다. 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 괴를물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 피부 반응의 징후가 나타되면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다. 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이) 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 진해기침을 그치게 함(거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기용약) 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것) 2) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상의 경우도 만 2세 미만의 영아(젖먹이) · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(젖먹이) · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다. 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 전촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위 부불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나, 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상급 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우 ① 속이나 필사시 : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다. ② 피부점막만중후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수

있다. ⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다. 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것. 5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【수신자부담고객상담실】 080-988-8889

【제조회자】 조이제약(주) 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

인터넷홈페이지 : <http://www.choa.co.kr>

【제조자】 (주)노바엘헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업로 16-53

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 한국약물안전관리원 | 1644-6223, 14-3330

개정연월일 : 2024. 05. 09 (Rev.0)

제조
번호
사용
기한

착인공간
35 × 18 mm
인쇄 시 삭제

