

일반의약품 **조제용**

소화불량 체했을때

# 엠제스티정

1,000정

[원료약품 및 그 분량] 1정(505 밀리그램) 중

■ 유효성분 : 판크레아틴(KP)(전분당화력 2,940단위/일, 단백소화력 29,400단위/일, 지방소화력 1,008단위/일로서) ..... 175mg  
셀룰라제(KP)(섬유소당화력 60단위/일로서) ..... 50mg  
우담즙 건조엑스(생규)(콜린산으로서 11.25mg) ..... 25mg  
디메티콘(EP) ..... 25mg

■ 타르색소 : 황색203호, 청색1호

■ 기타첨가제(동물유래성분) : 우담즙 건조엑스(소, 담즙), 유당수화물(소, 우유), 판크레아틴(돼지, 췌장)

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산 나트륨, 콜로이드성이산화규소, 탭실드녹색(39G402), 탭실드클리어(92C569), 탭실드 흰색(19W623), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 장방형의 장용피를 한 연녹색의 필름코팅정

[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1회 2정, 1일 3회 식후복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactosemalabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 2주 정도 투여하여도 증상이 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단 될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형

제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 1,000정 / 병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1 ~ 30 °C) 보관

[소비자상담실] 080-811-3011

[판매자 및 제조자] 메딕스제약(주)

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

· 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

· 최종 개정연월일(2025.10.13)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.

· 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국 의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

**Medix 메딕스제약**

제조번호 : 00000

사용기한 : 0000. 00. 00



8 806258 016228

251013-01