

인쇄사양서		
제품명	메가벤포큐정	
포장단위	설명서	
Size (장×폭×고)		
140 × 200 mm		
종이재질		
70 모조		
코팅		
무광라미네이팅		
후가공		
통스		
Colors		
		K 1도
바코드		
제조자		
메디스제약(주) / 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170		
판매원		
SK케미칼(주) : 충청남도 천안시 서북구 입장면 용정도하길 215-20		

일 반 의 약 품
KGMP적격업체

항산화 효과
고함량 기능성 활성비타민

메가벤포큐정
MegabenfoQ



【원료약품 및 그 분량】 1정 (893밀리그램) 중

■ 유효성분

· 폴산 (KP) ······ 0,5 mg

· D-비오틴 (USP) ······ 0,5 mg

· 시아노코발라민 (KP) ······ 0,5 mg

· 산화아연 (KP) ······ 30 mg

(아연으로서 24,1 mg)

· 유비데카레논 (KP) ······ 10 mg

· 셀레늄함유건조효모 (KP) ······ 25 mg

(셀레늄으로서 13,5 mcg)

· 리보플라빈 (KP) ······ 50 mg

· 이노시톨 (KP) ······ 50 mg

· 피라독신염산염 (KP) ······ 50 mg

· 벤포티아민 (KP) ······ 130 mg

(티아민염산염으로서 94 mg)

· 니코틴아미드 (KP) ······ 20 mg

· 아스코르브산 (KP) ······ 100 mg

· 갈마오리자놀 (KP) ······ 10 mg

· 우로스데옥시콜산 (KP) ······ 30 mg

· 토코페롤아세테이트2배산 (KP) ······ 20 mg

(비타민D로서 10 IU)

· 콜레칼시페롤능축분말 (EP) ······ 10 mg

(비타민D로서 1,000 IU)

· 판토텐산칼슘 (KP) ······ 50 mg

■ 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포버든, 탈실드칼색(19W623), 탈실드칼색(99B917)

【성상】 갈색의 타원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시 - 발육기 - 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육발량

- 구루병의 예방

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(하리)통, 어깨 결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

- 각기

- 눈의 피로

3. 아연의 보급

【용법 · 용량】 만 8 세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장(콩팥)결석 환자

5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 안산염, 칼슘염, 경구먹는, 복용하는용 테트라사이클린계 제제, 제산제

2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 만 1세 미만의 젖먹이

2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

4) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)

5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는) 대장염 등의 위장질환 환자

7) 심장 · 순환 기계기능 장애 환자

8) 신장(콩팥)장애 환자

9) 자단백혈증 환자

10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

12) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 헤징(이차염 등 지방대사 이상) 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 피부염, 딸 · 효출시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분) 통증, 저혈압, 폐부종(부기)

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구먹는, 복용하는용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 피라독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

10) 우발적으로 과량복용 한 경우

11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것

3) 각종 요강사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

4) 요를 황색(노란색)으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 일반적 주의

1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.

환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (일패하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1 ~ 30 ℃)보관

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【소비자상담실】 080-021-3131

• 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.

• 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

• 첨부문서 최종 개정연월일(2024.06.04)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)에서 확인 할 수 있습니다.

• 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

• 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

첨부문서 작성 연월일 : 2024.06.04 (Rev.01)



SK

케미칼

Life Science Biz.

메디스제약

메디스제약(주) : 충청남도 천안시 서북구 입장면 용정도하길 215-20



Medix

메디스제약

MEDIX PHARM. CO., LTD.

메디스제약(주) : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170