

	유형 정보		
--	-------	--	--

유형경제		

이후, 2004년 7월 14일 임상시험을
 개시한 70세 이상 3개월 정도 인지능을 감소시킨 다양한 베타아밀로이드(β-amyloid) 및/또는 설프닐유도체 9/1 또는 10인술에 대한 이중 무작위 투약 실험 및 안전성 시험은 24주 지속기간의 이송을 가짐, 4주와 24주 시점에
 서 평가되었다. 베타아밀로이드 환형은 첫 2주 동안 인지능을 증가시켰으며, 이후 용량증가에서 사용되었다. 다
 양한 베타아밀로이드 환형에 대한 약의 추가적용은 24주에서 4주 동안 하위 HbA_{1c} 계를 낮추었다. 24주 시점
 에 -0.64%(95% CI: -0.81, -0.48; p<0.0001), HbA_{1c} 계를 비교한 하위군 분석에서 각각의 베타아밀로이드
 유형은 HbA_{1c} 계가 증가하였다. 또한, 24주까지 약의 추가적용은 FPG에 대해 약과 무관한 감소를
 나타내었다(24주: -20.7mg/dL 변화)

리글루민과 심플라그 및 안전 시험(연구(CARMELO)). CARMELO는 90세의 베타아밀로이드 또는 인지
 능을 감소시킨 하위군을 대상으로 한 이중 무작위 투약 시험(607명)을 포함하여 24주 지속기간의 이송을 가
 지고, 인지 및 안전성 시험을 포함. 치료에 리글루민을 5mg/kg(34주) 또는 9위(3485명)를 추가한 무작위 투
 약 시험에서, 안전성 및 약효는 75세 이상의 환자(121명/74.4%)와 인지능을 추가한 1348명(82.6%)로 비교한
 결과, 연평균(eGFR)은 45ml/min/1.73m²(74.4%)와 인지능을 추가한 1348명(82.6%)로 비교한
 결과, 연평균(eGFR)은 45ml/min/1.73m²(74.4%)와 인지능을 추가한 1348명(82.6%)로 비교한 결과, 연

정밀방비 기밀유지, 실온(∼30℃) 보관
정단유리 30 정밀, 300 정밀
정밀(유료)기간 제조일로부터 36 개월

자제한 품목여부 또는 신고사항은 식품안전품질통합시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의약품 등록 정보 참조.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

오용(잘못된 사용)을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

사용(유료)기간이 지난 약품들은 사용하지 마십시오.

본 약품들은 우수약품물 제조관리 및 품질관리기준(GMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산되었습니다. 만약 구형 사용(유료)기간이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 또는 손상된 약품들은 약국까지 가져와 약품의 판매처로부터 교환하여 드립니다.

◆ 소비자상담실 : 060-388-3333 (수신자부담)

본 약품의 장상적인 사용임에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약사안전관리센터(1644-6223, 14-3300)에 할 수 있습니다.

본 약품들을 사용(비용)하기 전에 첨부서류를 주의깊게 읽으시고, 항상 본 약품과 함께 보관하시기 바랍니다.



Total
Printing

성신문화사 **북라벨·메뉴얼·이중라벨 전문**

서울시 중구 마른내로 2길 17 성신빌딩 TEL 02-2263-0621

www.booklabel.co.kr | www.북라벨.com

업체명	일화
제품명	트리나정5mg
규격	204 x 420mm

인쇄 결과물에 대하여 완성된 제품은 당사에 책임이 없음을 고지합니다.