


|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 유형   | 매뉴얼팩                                                               |
| 인쇄   | <input checked="" type="checkbox"/> 양면 <input type="checkbox"/> 단면 |
| 규격   | 138×210mm                                                          |
| 접지규격 | 35×35mm                                                            |



디카돌정 2024.06.26(Rev.01)

일반 의약품 **조제용**

K G M P  
우수의약품지정업체

## 디카돌정

### ■ 원료약품 및 분량 1정 중

- 유효성분 : 탄산칼슘 95%과립(별규) 263.15밀리그램(칼슘(으)로서 100밀리그램), 클레칼시페롤농축분말(EP) 10밀리그램(비타민D(으)로서 1,000아이.유)
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색5호
- 첨가제(동물유래성분) : 클레칼시페롤농축분말-콜레스테롤(양, 양모), 젤라틴(소, 가축)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이III녹색(85A610003), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 히드록시프로필셀룰로오스

### ■ 성상 녹색의 장방형 필름코팅정

### ■ 효능 · 효과

- 다음 경우의 비타민 D의 보급  
- 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.  
- 뼈, 이의 발육불량  
- 구루병의 예방

### ■ 용법 · 용량

만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회 1정을 복용

### ■ 사용상의 주의사항

#### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 고칼슘혈증(hypercalciuria : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 신장결석 환자
- 심한 증상의 신부전 환자

#### 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

#### 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 만 1세 미만의 젖먹이
- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
  - 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 신장장애 환자
- 저단백혈증 환자

8) 강심배당체를 투여 중인 환자

9) 신장결석 병력이 있는 환자

10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것

#### 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진

2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

5) 우발적으로 과량복용한 경우

6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

#### 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 투여할 것
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것

#### 6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

■ 저장방법 · 사용기간 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 30정/병, 90정/병

■ 제조의뢰자 · 판매원 한국프라임제약(주) - 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

■ 제조자 알보젠코리아(주) - 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 55-8(전공정 또는 포장외 전공정), 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 36(포장공정)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

개정일자: 2024.06.26(Rev.01)

**Prime 한국프라임제약**