

BORYUNG			
제품정보	Date. 2024. 11. 06	Project Name. 보령컨슈머_오큐에이 연질캡슐 _설명서	Size. 180 X 210 mm
	Color. 1도		
BLACK			
Memo. 인쇄용지 :			

180

일반의약품

오큐에이 연질캡슐

제 품 명 오큐에이연질캡슐

원료약품 및 그 분량 1캡슐(940 mg) 중

- 유효성분

간유(별규)(비타민A로서 500 IU) 500mg
콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 25mg
티아민질산염(KP) 20mg
리보플라빈(KP) 6mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 20 IU) 20mg
산화아연(KP)(아연으로서 8.03 mg) 10mg
- 첨가제(천연색소)

: 차차청색소
- 첨가제(동물유래성분)

: 젤라틴(기원동물 : 소(사용부위 : 가죽), 돼지(사용부위 : 가죽))
- 기타첨가제

: 농글리세린, 레시틴, 황납, 산화티탄, 비결정성소르비톨 액, 풍기름

성 상 주황색의 유상내용물을 함유한 암청색의 타원형 연질캡슐

- 효능·효과

• 다음경우의 비타민 A, E, B₁, B₂ 의 보급

– 육체피로

– 임신·수유기

– 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

– 노년기

– 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

· 눈의 건조감의 완화

· 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)

· 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)

· 각기

· 눈의 피로

· 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 아연의 보급

용법·용량 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2캡슐 복용

사용상의 주의사항

- 1) 경고

(1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A결핍증 환자는 제외).
- 2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(2) 만 3개월 미만의 젖먹이

(3) 만 12개월 미만의 젖먹이

(4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

(5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 4) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이

180

- 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
- (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (4) 신장장애 환자
- (5) 저단백혈증 환자
- (6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 묽은 변, 식욕부진, 홍반(붉은 반점), 두드러기, 습진, 반구진성 발진, 부종(부기), 부종(부기)-수분저류(고임)(신부전 또는 심부전 환자), 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종

(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.

(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

(4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

(5) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양증) 위험을 높일 수 있습니다.

(6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오

(7) 우발적으로 과량복용 한 경우

(8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 6) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.

(2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.

(3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

(4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

(5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
- 7) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.

(3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포장단위 120 캡슐/상자(12캡슐/PTP×10)

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기간 제조일로부터 24 개월

소비자상담실 080-708-8070 / 수신사 부담 전화

판매원 보령컨슈머헬스케어(주) 서울특별시 종로구 창경궁로 136

제조원 코스맥스파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.
- ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
- ※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서 작성일자 : 2024년 11월 06일

210

210