

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다. ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330) ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900 ※ 작성일자 [2024.07.10(Rev.0)] 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조번호 :
사용기한 :

(01) 08806562033520



HIP'S⁺

일반의약품

뭉치고 걸릴때 리렉사에스 정

어깨걸림

신경통

요통

20정

뭉치고 걸릴때
리렉사에스 정

65mm

20mm

일반의약품 정보(계속됨)

baskhanbio

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【제조(외)자】 (주)바스칸바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

【사용기한】 (연.월.일) 용기 왼쪽면 표시일까지

【제조사】 (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

L240710-0

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전에 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】

1정 중

- 클로르록사존(KP) 150 mg
- 에텐자미드(KP) 150 mg
- 카페인수화물(KP) 25 mg (카페인으로서 22.87 mg)

【성상】

흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

신경통, 요통(허리통), 어깨걸림

【용법·용량】

성인 1회 1~2정 1일 2회 동등(동중) 또는 발작시에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 양아(첫 먹이), 유아 및 어린이(14세 이하)
- 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선

질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람. 5) 고령자(노인), 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부. 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

2. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 다음 약들과 동시에 복용하지 말 것 - 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(종혈)되어 붉어짐, 구역, 구토, 변비, 식욕 부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 2) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 3) 장기 연용(계속 복용) 하지 말 것.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선/햇빛을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【첨가제】

- 기타첨가제 : 하드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 산화티탄, 말크, 폴리에틸렌글리콜6000

108mm