

Ca

일반의약품 조제용

칼슘/비타민D 보급제

칼디텍정

30 Tabs. 탄산칼슘·농축콜레칼시페롤
동광제약

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중 유효성분 : 탄산칼슘(USP)···750mg(칼슘으로서 300mg) 제조번호/사용기한
 · 농축콜레칼시페롤 과립(EP)···10.0mg(비타민D로서 1000IU) *동물유래성분 : 농축콜레칼시페롤
 과립 중 콜레칼시페롤(양-텔), 젤라틴(소-가죽), 유당수화물(소-우유), 기타 첨가제 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스 **[성상]** 흰색의 타원형 필름코팅정 **[효능·효과]**
 1. 다음 경우의 비타민 D의 보급 - 임신·수유기, 발육기, 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의
 효능·효과는 다음과 같다. · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 2. 칼슘 결핍 및 기타 칼슘의
 보급 **[용법·용량]** 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정을 복용 **[사용상의 주의사항]** 라벨 뒷면 참조
[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 **[제조외곽지]** 동광제약(주) 경기도 평택시 산단로 115
[제조사] (주)노바엘엠스케이 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53 DK300624



[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한증상의 신부전 환자 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 만 1세 미만인 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다 5) 심장·순환기계 기능 장애 환자 6) 신장 장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 강심배당체를 투여 중인 환자 9) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우, 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진 등 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 3) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

4) 항알도스테론제, 트리아메테렌과 병용투여시(함께 복용시) 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 5) 우발적으로 과량복용 한 경우 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60정/병, 30정/병

■ 이 첨부문서 작성일자 2024년 6월 30일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 동광홈페이지 : www.dkphm.com에서 확인할 수 있습니다. ■ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다. ■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. ■ 수신자부담 소비자 상담실 : 080-776-1472

빛에 노출 시 변색의 우려가 있으므로 처방 및 조제 시 주의 필요

Ca

일반의약품 조제용

칼슘/비타민D 보급제

칼디텍정

60 Tabs. 탄산칼슘·농축콜레칼시페롤
동광제약

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중 유효성분 : 탄산칼슘(USP)···750mg(칼슘으로서 300mg) 제초번호/사용기한
 · 농축콜레칼시페롤 과립(EP)···10.0mg(비타민D로서 1000IU) *동물유래성분 : 농축콜레칼시페롤
 과립 중 콜레칼시페롤(양-텔), 젤라틴(소-가죽), 유당수화물(소-우유), 기타 첨가제 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스 **[성상]** 흰색의 타원형 필름코팅정 **[효능·효과]** 1. 다음 경우의 비타민 D의 보급 - 임신·수유기, 발육기, 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. · 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 2. 칼슘 결핍 및 기타 칼슘의 보급 **[용법·용량]** 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정을 복용 **[사용상의 주의사항]** 라벨 뒷면 참조 **[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 **[제조외곽지]** 동광제약(주) 경기도 평택시 산단로 115 **[제조사]** (주)노바엘엠스케이 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53 DK300624



[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한증상의 신부전 환자 6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다 5) 심장·순환기계 기능 장애 환자 6) 신장 장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 강심배당체를 투여 중인 환자 9) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우, 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진 등 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 3) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

4) 항알도스테론제, 트리아메테렌과 병용투여시(함께 복용시) 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 5) 우발적으로 과량복용 한 경우 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60정/병, 30정/병

■ 이 첨부문서 작성일자 2024년 6월 30일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 동광홈페이지 : www.dkphm.com에서 확인할 수 있습니다. ■ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

■ 수신자부담 소비자 상담실 : 080-776-1472

빛에 노출 시 변색의 우려가 있으므로 처방 및 조제 시 주의 필요