

POT130I02-00

코감기 및 알레르기성 비염 치료제 알러피드정

일반의약품
분류번호:01410

【원료약품 및 분량】1정 중

- 유효성분 : 슈도에페드린염산염 (USP) 60mg
트리프로리딘염산염 (USP) 2.5mg
- 동물유래성분 : 유당수화물 (소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈, 카르복시메틸셀룰로오스칼륨, 스테아르산마그네슘, 경질무수규산

【성상】백색의 원형 정제

【효능·효과】

코감기, 알레르기 및 혈관운동성 코염에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

【용법·용량】

성인: 1회 1정, 소아(12~14세): 1회 1/2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고 슈도에페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약에 과민반응 병력이 있는 환자
- 중증(심한 증상)의 간 및 신기능 장애 환자
- 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자
- 전노 형성을 수반하는 배뇨(소변을 누)장애 환자
- 고혈압 및 관상동맥(심장동맥) 질환 환자
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 2세 이하의 영아(갓난아기)
- MAO 억제제를 투여중인 환자
- 파라옥시안식향산메칠에 과민반응 환자(파라옥시안식향산메칠 함유제제에 한함)
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 혈압강화제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO 억제제, 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸리움, 베타나이드, 데브리스코펜, 메칠도파, 교감신경성약(총혈제거제, 식욕억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제(억제제)와 병용(함께 복용)투여하지 않는다.
- MAO 억제제의 긴 작용시간 때문에 MAO 억제제 투여 최소 15일 후 이 약을 투여한다.

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

이 약의 투여 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의한다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 천식 환자
- 녹내장 환자
- 심질환 및 부정맥 환자
- 당뇨병, 갑상선기능항진증 환자

5) 전립샘비대로 인한 배뇨(소변을 누)곤란 환자

6) 12세 미만의 소아

6. 다음과 같은 사람은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 경우
- 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한(땀이 남), 경미한(가벼운) 혈압강하, 시력장애, 산동(동공확대), 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직(굳음), 아테토시스, 간대상 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비 등의 중추신경계 이상이 나타날 경우
- 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감(화끈감) 등의 과민반응이 나타날 경우
- 구갈(목마름), 구역, 구토 등의 소화기계 이상이 나타날 경우
- 배뇨(소변을 누)곤란 등의 이상이 나타날 경우
- 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있다.
- 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP), 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 경우
- 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현(드러냄)될 경우

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

과량투여 시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용한다. 슈도에페드린 제거에는 투석하도록 한다.

8. 저장상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】제조일로부터 36개월

【포장단위】10정/피티피

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 070-4346-1213으로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품등 정보' 에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정연월일: 2024년 06월 13일

제조사: (주)한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127

제조의뢰자: (주)벡스팜코리아 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

품명	알러피드정 설명서
규격	155*180
재질	70g 모조紙
코팅	무
폰트	7pt
관리번호	POT130I02-00
인쇄도수	먹 1 도
디자인	티엔팜
제조자	(주)한국파비스제약
제조의회자	(주)넥스팜코리아