

크기

일반의약품, 원료약품 7pt
첨가제~의약품정보참조 7pt
본 의약품은~할 수 있습니다. 7pt
제품개봉 또는~ 7pt
자세한 품목 허가 또는~ 6pt

줄간격

원료약품~
의약품정보참조 9~9.5pt

날짜	2024년 06월 24일	기타	모서리 라운드 1.5R / 물타입	● 재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ● 전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ● 빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ● 같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 호일 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에게 없음을 고지합니다. 유익하시기 바랍니다.
고객사	노바엠헬스케어	색상	4원색	
제품명	발란티스 1000정	폰트	칼선(인쇄되지 않습니다.)	
규격	230×90mm			
재질	아트지			
수량	EA			

※ 인쇄진행 전 시안 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 당사에는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.

230 mm

90 mm

일반의약품
조제용

1000정/병

발란티스정

(탄산수소나트륨)

제조사
ILHWA Ph.

제조사
NOVA M Healthcare

• 제조의뢰자 : (주)일화 / 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지2길 55
• https://www.ilhwa.co.kr
• 제조자 : (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

【원료약품 및 그 분량】 1정 중 • 유효성분 : 탄산수소나트륨(KP) 500mg • 동물유래성분 : 유당수화물(건강한 소의 우유) • 기타 첨가제 : 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 셀룰로오스, 폴리비닐피롤리돈, 히드록시프로필셀룰로오스, 히드로멜로오스 **【성상】** 흰색의 원형 필름코팅정 **【효능·효과】 1. 주요효 효과** 1) 다음 질환의 재산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 2) 산증의 개선 **2. 다음 질환에도 사용할 수 있다.** 요산배설의 촉진과 통풍발작의 예방 **【용법·용량】** 성인 : 탄산수소나트륨으로서 1회 0.5-1g, 1일 3-5g을 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절한 증감한다. **【사용상의 주의사항】 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.** 1) 나트륨 섭취 제한을 필요로 하는 환자(고나트륨혈증, 부종, 임신중독증, 방광결석, 고혈압환자 등) 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. **2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.** 1) 심한 소화관궤양 환자 2) 신장에 환자 3) 심기능장애, 폐기능장애 환자 4) 저클로레스탈리움 등의 전해질실조 환자 **3. 부작용** 1) 대사이상 : 알카리증, 나트륨 축적에 의한 부종 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 강량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다. 2) 소화기계 : 때때로 위부팽만, 트림 드물게 위산의 반동성 분비 등이 나타날 수 있다. **4. 일반적 주의** 1) 율혈성성부전, 부종 또는 나트륨정제 뿐만 아니라 감노증 또는 무뇨증이 있는 환자에는 주의하여 투여한다. 2) 과산증에 투여할 때에는 식전 공복에 투여하며 탄산가스의 자극을 적게하기 위하여 다른 제산제와 배합하여 투여한다. 3) 완충성이 있으나 장기 투여로 알카리증(혈뇨, 구토, 출혈, 탈수증)이 일어날 수 있으므로 주의하여 투여한다. **5. 상호작용** 1) 이 약의 소화관내, 체액의 pH 상승에 의해 병용약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다. 2) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알카리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

【포장단위】 1000정/병 **【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
【사용기간】 제조일로부터 36 개월

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)의약품 정보 참조 ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 ※ 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오 ※ 사용유효기간이 지난 약품은 사용하지 마십시오 ※ 본 약품은 우유와 약품 제조관리 및 품질관리기준(GMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 약품입니다. 만약 구입한 사용유효기간이 경과되었거나 변질, 오염 또는 손상된 약품은 약국개설자 및 약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ◆ 소비자상담실 : 080-388-3333 (수신자부담) ※ 약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다. ※ 본 약품을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 항상 본 약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

제품 개봉 또는 취급 시에 포장재용기(케이스)에 상처를 입힐 수 있으니 주의하십시오.

제정연월일 2024년 06월 11일

【제조번호】
【사용기한】

35X18mm

8 806409 046920

NP24061000 LT 240600

*물당수량: (500) EA
*물방향: 상단(두출),OUT