

SI12154-00

일반의약품
분류번호 319
조제용

이든비오틴정 5mg(비오틴)

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분: 비오틴(USP) ~5mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 포비돈

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능 · 효과]

비오틴 결핍으로 인한 손·발톱 또는 모발 성장 장애

[용법 · 용량]

1일 1회 1정, 식사전 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 날계란 흰자와 비오틴이 비가역적이며 약효가 없는 복합체를 형성하므로 날계란과 비오틴을 동시에 복용하지 않는다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 임부, 수유부: 임신부 · 수유부가 복용한 경우에 대한 임상 연구는 제시되어 있지 않다. 또한 임신, 태아의 발달 단계, 태반의 발달 및 출생 후 과정에 미치는 영향에 관한 동물 연구도 충분히 이루어지지 않았다. 지금까지 임신부 복용에 있어서의 부정적인 영향에 대하여 알려진 바는 없지만 임신 중의 복용은 신중하게 이루어져야 한다. 또한 작용물질은 모유로 분비된다.
 - 항경련제 복용환자: 카르바마제핀, 페니토인, 페노바르비탈이 비오틴의 대사를 증가하여, 오랫동안 지속되는 항경련제 투여로 비오틴의 혈중농도 감소가 발생된다.
 - 항생제 복용환자: 항생제의 사용은 대장에 있는 박테리아에 의해 생성되는 비오틴을 감소시킬 수 있다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 두드러기, 위장장애
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 100정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 받은 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화(02) 3487-7005로 하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어아하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정연월일: 2024년 06월 14일

[제조사] 태극제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

[제조회사] (주)이든파마 충북 진천군 문백면 농다리로 1149