

일반의약품 | 조제용

진코에이정

240밀리그램

(은행업건조엑스)

일반의약품
조제용

진코에이정240밀리그램

(은행업건조엑스)

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(630 mg) 중

- 유효성분 : 은행업건조엑스(생규)240 mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 203호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제 : D-만니톨, 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카멜로오스나트륨, 탭크, 탭실드녹색(99G1033)

[성상] 녹색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과] 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증 (동맥 경화 증상) 과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

[용법·용량]

성인

은행업건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다. 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

[사용상주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 은행업건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
- 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
- 임산부
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 항응고제(예: 펜프로쿰몬, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
- 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아젠펙과 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용율에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있다. 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 한다.
- 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
- 이 약을 복용(사용)하여 뇌전증 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
- 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.
- 이상반응

- 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.
- 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
- 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증). 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다. 장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.
- 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
- 어지러움
- 가려움증
- 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

5. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 상온(15~25℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[포장정보] 10정/피티피, 30정/상자, 60정/상자, 90정/상자, 100정/상자, 120정/상자, 200정/상자, 30정/병, 60정/병, 90정/병, 100정/병, 120정/병, 200정/병, 300정/병, 500정/병

[제조자] 코스맥스파마㈜ 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23, 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

[제조외뢰자] 엔비케이제약㈜ 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539

[문의전화] 소비자상담실 : 080-957-7190(수신자요금부담)

※ 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있으며, 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에서 할 수 있습니다.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품 등 정보'에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 작성년월일 : 2025.01.23

0A113-00

[제조자]

COSMAX PHARMA

[제조외뢰자]

엔비케이제약(주)
NEO BIO KOREA PHARM. CO., LTD.

» 접지 후 모습

일반의약품 | 조제용

진코에이정

240밀리그램

(은행업건조엑스)

날짜	2025년 02월 26일	기타	론타입	●재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ●전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ●빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ●같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님의께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다. ※ 수정된 원본 데이터는 제공되지 않습니다.
고객사	-	색상	먹색(K100) —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)	
제품명	진코에이정240밀리그램			
유형	매뉴얼팩			
인쇄	☑양면 □단면			
규격	138×210mm	폰트	- 제품명 : 7포인트 이상 - 일반의약품 문구 : 7포인트 이상 - 본문 : 7포인트	
접지규격	35×35mm			
재질	캡퍼스지 50g			
관리번호	-			
※ 인쇄진행 전 시안 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시안 승인 후 진행된 인쇄 결과물에 대하여 당사는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.				

스티커 / 설명서제작업체

I주무궁화LNB 매뉴얼팩®