



일반의약품

코드리버오일이 함유된 눈영양제 아이코드 연질캡슐



[성상] 주황색의 내용물을 함유한 청색의 타원형 연질캡슐제

[유효성분] 1캡슐(970밀리그램) 중

간유(USP)(비타민A로서 500IU)	500 mg
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	25 mg
티아민질산염(KP)	6.3 mg
리보플라빈(KP)	3 mg

·첨가제(동물유래성분) : 숙신산젤라틴(소, 가축내피)

·기타첨가제 : 경화유, 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 치자청색소, 풍기름

[효능·효과]

· 다음 경우의 비타민 A, B1, B2의 보급

– 육체피로 – 임신·수유기 – 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시 – 노년기

– 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

· 눈의 건조감의 완화 · 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)

· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부병

· 각기, 눈의 피로

[용법·용량] 만8세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고 1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것 (비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외 하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터 의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 붉은 변, 변비, 설사, 식욕부진, 홍반(붉은 반점), 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기), 부종(부기) · 수분저류(고임)(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양성) 위험을 높일 수 있다.
- 3) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제품 측면 표기일까지

[설명서 개정연월일 / 관리번호] 2025.07.16 / P2507-01

[포장단위] 120캡슐, 240캡슐

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거, 상당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- ※ 최종 개정 연월일(2025.07.16) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 합니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해 구제신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 혹은 14-3330)

[판매자]



경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실 : 080-021-1010(수신요금부담전화)
홈페이지 www.jilyang.co.kr

[제조자]



충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 69