

ILDONG
푸레파센 600정
(디오스민)

P

원료약품 및 분량(1정 중)

- 유효성분 : 디오스민(KP)600mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 오파드라이QX분홍색(321A640008), 오파드라이투명색(EZ254U590005), 콜로이드성이산화규소, 탈크

성상

분홍 또는 연분홍의 타원형 필름코팅정제

효능·효과

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
2. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료
3. 치질과 관련된 징후의 치료

용법·용량

정맥 부전 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사 시 복용합니다.
치질 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2~3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자 2) 수유부
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
임부 (필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 합니다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드뭅니다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 : 이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않습니다. 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 합니다. 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 합니다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

30정/상자((10정/피티파x3)),
60정/상자(((10정/피티파x3)x2)),
30정/상자((30정/병)), 60정/상자((30정/병x2))

※사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※이 설명서는 2024년 7월 3일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 부작용 신고·피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

제조사 : 태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍

제약공단3길 123

제조의뢰자 : 일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2

공장 경기도 안성시 공단1로 25

www.ildong.com

소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)