

300*232*132

복합비타민
피로 회복엔!
파워헬스민 연질캡슐

육체피로 / 임산·수유 / 체력저하 / 노년기

1캡슐 X 500EA

| 육체피로 |

【사용상의 주의사항】	
1.경고: 일부에 비타민 시(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형률 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것. (비타민 A결핍증 환자는 제외.)	2. 이 약의 투여에 의하여 생리과 이상보다 빨리지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 3개월 미만의 젖먹이 3) 대두유에 과민성(가나 알레르기) 병력이 있는 환자 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자	3) 에스트로겐을 포함한 장구(약)는용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈관 막힘(성 소인)이 있는 환자가 비타민 E를 복용 할 경우 혈전혈관 막힘(성)의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경 계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 고령환 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도 당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 7) 장기간 고용량의 비타민 시(레티카로틴으로부터 전환된 것을 제외한 것)를 섭취하는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈약성증) 위험을 높일 수 있다. 8) 무방적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 레보도파	6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. 3) 이 약에 함유된 비타민 시는 장기간 사용에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. 4) 각종 요양사제 병용의 검사를 방해할 수 있다. 5) 요를 황색으로 변화하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다. 6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체지방률이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 조절할 것. 환자가 다른 증상을 지질계를 동시에 투여하고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하여 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
4. 다음과 같은 사람(영양)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 고요산산노증 환자(hyperurata : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 의과에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신생물 등을 중심으로 하는 기형발생(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치(예)에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. 5) 통풍환자 또는 신장질환(환)이 있는 환자 6) 고지단백혈은, 당뇨병성고지질혈증 및 특정이차원 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자	7. 저장법의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 치사량을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오염(광물) 사용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
5. 다음과 같은 경우 이 약을 복용을 중단 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 이 청부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종(부기), 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종종되어 붉어짐), 붉은 변	【 제조의뢰자 】 미래바이오텍(주) 경기도 안성시 공단2로 104 【 제조자 】 (주)시흥 중정팩도 청주시 오송읍 오송생명로 61 【 판매자 】 한국팜이(주) 경기도 의왕시 천우물길 40

일반의약품 정보
【 원료약품 및 분량 】 1캡슐 중 ■ 유효성분 니코틴아미이드(NIA) : 20mg 리보플라빈(RP) : 3mg 아스코르브산(AS) : 60mg 타이민(장산) : 2mg 레티놀(레티아이드)(비타민A)로서 5,000 IU : 5mg 토코페롤(아스코르비(비타민E)로서 10 IU : 10mg 피리독신(장산) : 3mg ■ 첨가제 : (동물유래성분) : 속산산셀라틴(스, 가축) ■ 기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백당, 소르비톨(비결정성), 에틸바닐린, 적색산화철, 콩기름, 판유 【 성 상 】 황갈색의 유상물질(7)물상태 물질)이 든 알약색의 장방형 연질캡슐 【 용법 · 용량 】 만 8세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 1회 복용한다. 【 효능 · 효과 】 ○ 다음경우의 비타민 A, E, B1, B6, B12, C의 보급 1) 육체피로 2) 임신·수유기 3) 병중·병후(병)을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 4) 노년기 ○ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. 1) 눈의 건조증의 완화 2) 아령증(눈)에 잘 못보는 증상) 【 사용기한 】 제조일로부터 36개월 【 저장방법 】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 【 제조의뢰자 】 미래바이오텍(주) 경기도 안성시 공단2로 104 【 제조자 】 (주)시흥 중정팩도 청주시 오송읍 오송생명로 61 【 판매자 】 한국팜이(주) 경기도 의왕시 천우물길 40 ※ 본 제품은 영국의 품질관리를 위한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손의 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다. ※ 이 문헌(2024년 07월 05일)적용(2024년 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 약품 정보)는 미래바이오텍 홈페이지 또는 약약품통합정보시스템(http://medug.mds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부속(2024년 07월 05일)적용(2024년 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 약품 정보)는 미래바이오텍 홈페이지 또는 약약품통합정보시스템(http://medug.mds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. Rev.00

| 일반의약품 |

육체피로 / 임신·수유 / 체력저하 / 노년기

피로 회복엔!
파워헬스민 연질캡슐

1캡슐 X 500EA

1캡슐 X 500EA
피로 회복엔! 파워헬스민 연질캡슐

8806575040524