

제 품 명	노바엠헬스케어 (SK케미칼) 트립에스정 10정	color	후가공	*참조	부분 수정사항
type	단케이스		☐ 부분UV코팅	240705 신규 (노바엠 엔디멜라징 칼선) 240710 로고 및 디자인 위치 수정 240716 문안수정 240717 문안수정 240719 문안수정	
size	108 x 65 x 18 mm				
재 질	CCP 300g				
특이사항	칼선 : DW-6199				



무코팅

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
 - 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 **부작용 신고** 및 **피해구제 신청**은 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.
- 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.

제조번호:
사용기한:
(연월일)영중·부중(부기)
수술 및 외상(상처) 후
유증물제(젓고임)

10정



(Tryp-S Tab.)

트립에스정

식물성 성분 함유 소염효소제

일반의약품

식물성 성분 함유 소염효소제
트립에스정

65mm

- 【성 상】 연녹색의 원형 장용성 필름코팅정
- 【제조자】 (주)노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53
- 【제조외화자】 에스케이케미칼(주) 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149
- ※ 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나 제품상단 전용전화(무료: 080-021-3131)를 통하여 확인할 수 있습니다.
- ※ 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.

NOVA M
Healthcare
(주)노바엠헬스케어

18mm

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】	1정 중
결정트립신(2,500(USP 트립신 단위) (USP)	1mg
브로멜라인(20,000(브로멜라인 단위) (KP)	40mg

【효능·효과】

다름 질환 및 중상의 영중성(부기)의 완화: 수술 및 외상(상처) 후, 유증물제(젓고임)

【용법·용량】

- 성인: 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지용량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.
- 체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(galucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
1) 혈액응고이상 환자 2) 심한 간장애 또는 신장애(신장콩팥장애) 환자 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료

상의 유익성이 위험성을 상회(우울)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.) 4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용(사용))투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 사망 시 가능한 한 이 항목문서를 소지할 것.
1) 과민반응: 발진, 발적(홍반) 등 피부염 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 소화기계: 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다. 3) 혈액계: 드물게 코피, 혈액과 같은 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 약품 불하, 불시의 환이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

8. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

9. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

10. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

11. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

12. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

13. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

14. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

15. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

16. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

17. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

18. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

19. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

20. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

21. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

22. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

23. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것.

108mm

2024. 6. 25 작성