드로잉	품 목 명	품목번호	버전
	시노카엔플러스연질캡슐/설명서		240700
규 격	가로 : 120mm 세로 : 200mm		
인쇄규격			
글자포인트 8pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명, 성상, 효능/효과, 용법용량, 저장방법		
글자포인트 7pt			
색 상	K(먹), PANTONE 185C		
지종 / 코팅			
후 가 공			
비 고			

120*200mm

명예의 전당
ccm 소비자중심 Since 2009
소비자중심경영 | 공정거래위원회
현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

콧물 · 코막힘 · 재채기 · 인후통엔~

시노카엔® 플러스 연질캡슐

사용설명서
일반의약품
KGMP

• 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
• 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
• 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중
■유효성분
클로르페니라민말레산염(KP) ····· 4.00mg
카페인무수물(USP) ····· 20.00mg
벨라돈나총알칼로이드(JP)(총알칼로이드로서 0.20mg) ····· 0.20mg

■첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호, 황색203호
■첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소/돼지, 가죽)
■기타 첨가제 : 농글리세린, 부틸히드록시톨루엔, 산화티탄, 소르비톨 소르비탄액, 정제수, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜4000, 프로필렌글리콜

【성 상】 흰색의 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】
코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화
: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 매 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)
2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.
다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담제, 멀미약, 알레르기용약 등)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 심장질환, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 눔)곤란 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
4) 고령자(노인)
5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

240700

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
출혈성뇌졸중, 구역 · 구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 눔)곤란, 두통, 안면홍조(붉어짐), 비정상적인 눈부심
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 쇽(아나필락시)(과민성쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여
만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
4) 복용시에는 음주하지 말 것.

7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1 ~ 30℃) 보관

【포장단위】 10캡슐/피티피

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
※ 이 사용설명서 작성연월일(2024년 07월 05일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎ 14-3330, 1644-6223)

제조의뢰자 : 현대약품(주)
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55
제조자 : 코스맥스파마(주)
충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

♣ 제품문의처 : ☎1666-9979
사용설명서 작성연월일 : 2024. 07. 05

현대약품(주)