

고함량 콘드로이틴 800mg + 활성비타민B₁

일반의약품

콘센비타프리미엄 800정

원료약품 및 분량 (1정 중)

■ 유효성분 :

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	800.00mg
벤포티아민(KP)	50.00mg(티아민염산염으로서 36.15mg)
푸르셀티아민(KP)	50.00mg
피리독신염산염(KP)	50.00mg
농축콜레칼시페롤산(EP)	10.00mg(비타민D ₃ 로서 1000IU)
메코발라민(KP)	1.00mg
셀레늄함유건조효모(KP)	92.59mg(셀레늄으로서 50μg)
산화아연(KP)	5.00mg(아연으로서 4mg)

■ 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산 나트륨, 탭설드갈색(99B703)

성상

적갈색의 장방형 필름코팅정



효능 · 효과

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

· 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 · 각기 · 눈의피로
· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염),
구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

용법 · 용량

만 19세 이상 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 5) 신장장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자 7) 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역, 저혈압, 폐부종, 변비, 식욕부진, 홍반, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종 · 수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
 - 2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 60정/상자((30정/병x2))

- ※ 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 이 설명서는 2024년 7월 10일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 식품의약품 안전처 의약품 등 검색(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ **의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)**

제조사 : 성이바이오제약 주식회사
강원특별자치도 원주시 지정면
지래울로 184 1층 일부, 3층

제조의뢰자 : **일등제약주식회사**
본사 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2
공장 : 경기도 안성시 공단로 25
소비자상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)