

❖ 코오롱제약		Design by RX DESIGN STUDIO
품명	제스그린 설명서	진행일: 2024.08.06
규격	180 x 180 mm	
색상	1도 ● BLACK	

8가지 복합 기능성 소화제

제스그린TM

일반의약품

[원료약품 및 그 분량]

이 약 1정 중

- 유효성분**: 침강탄산칼슘(KP) 100mg
탄산수소나트륨(KP) 50mg
트리메부틴말레산염(KP) 50mg
메타규산알루미늄산마그네슘(KP) 40mg
(건조물이며) 산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg
감초가루(생규) 25mg
(글리시리진산으로서 0.63mg)
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제2000IV(별규) 20mg
(전분당화력(pH 4.5) 278 단위, 단백소화력 (pH 3.0) 170 단위)
리파제(KP) 7.5mg
(지방소화력(pH 6.0) 45 단위)
스코폴리아엑스(KP) 5mg
(총알칼로이드 [히오스시야민 및 스코폴라민]로서 50 µg)

- 첨가제(타르색소)**: 청색1호, 황색203호 ●**첨가제(동물유래성분)**: 유당수화물 (소, 우유)
●**기타첨가제**: 박하유, 스테아르산마그네슘, 산화티탄, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈, 폴리에틸렌 글리콜6000, 히프로멜로오스

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간(식사때와 식사때 사이에) 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 신장에(신장장애) 환자
- 4) 간장애 환자
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 6) 인산염 저하가 있는 환자

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본제의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

- 2) 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
- 3) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지르게 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

6. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

7. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 3) 장기연용(계속 복용)을 하지 않는다.
- 4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

8. 상호작용

위장진통, 진경제(경련완화제)와 병용 투여(함께 복용)하지 않는다.

9. 소아·임부에 대한 투여

- 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게 투여하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

[포장단위] 10 정/상자(10정/PTP)

[소비자상담] 080-203-6000(수신자 요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000) 에서 확인할 수 있습니다.

※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://hedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'란을 참조하세요.

[제조사] 주식회사 노바엠헬스케어, 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

[제조외의자·판매원] 코오롱제약(주), 대전광역시 대덕구 문평서로18번길 45

❖ 코오롱제약

최초 작성연월일: 2024.07.05

NBM240711