



글루타에스^정

소화불량으로 인한 위부팽만감

[원료약품 및 그 분량] - 1정 중 -

- 유효성분 : L-글루타민(USP) 250.00mg
비스무트차탄산염(USP) 200.00mg
산화마그네슘(USP) 30.00mg
디아스타제 · 프로테아제100(KP) 20.00mg (전분당화력 240단위 이상, 단백소화력 2000단위 이상)
시메티콘파우더(별규) 30.00mg (시메티콘(으)로서 19.6mg)
- 첨가제 (타르색소) : 청색2호, 황색203호
- 기타 첨가제 : 규화미결정셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이||AMB초록색(88A610005), 코포비돈, 콜로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨

[성상]

연두색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

다음 용량을 1일 3회 식사와 관계없이 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2정

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 만 7세이하의 어린이
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
2) 다른 약물을 복용하고 있는사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 어린이에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여하십시오.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 10정/피티피(10정/피티피 x 1), 120정/병

[사용기간] 제조일로부터 24개월

제조사 : (주)대웅제약/ 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 부작용 신고 및 피해구제 상담 : 한국약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)

대웅제약

작성 연월일 : 2024. 07. 15

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

H00
2302590