

올대원골드정 설명서

컬러 : 먹1도(단면)

버전 : V.0000

설명서(단면)

180 x 180



활성비타민 함유
피로회복, 뼈, 관절 건강
데일리 비타민

일반의약품

[성분·함량] 1정 중

• 유효성분 :

레티놀아세테이트과립(EP)(비타민 A로서 500IU)	1 mg
벤포타인(KP)(티아민염산염으로서 50.61 mg)	70 mg
리보플라빈부티레이트(KP)(리보플라빈으로서 6.88 mg)	12 mg
니코틴산아미드(KP)	10 mg
판토텐산칼슘(KP)	20 mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	20 mg
폴산(KP)	0.25 mg
메코발라민(KP)	0.5 mg
d-비오틴(USP)	0.2 mg
제피아스코르브산(별급)(아스코르브산으로서 50 mg)	51.55 mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민 D로서 500 IU)(동물유래성분 : 양, 양고)	5 mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민 E로서 100 IU)	200 mg
황산제아구리수화물(USP)(구리로서 0.5 mg)	1.96 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 25.03 mg)	41.5 mg
황산망간수화물(USP)(망간으로서 0.64 mg)	1.96 mg
셀레늄함유간조효소(KP)(셀레늄으로서 12.5 µg)	23.15 mg
산화아연(KP)(아연으로서 15.02 mg)	18.7 mg
무수인산수소칼슘(UP)(칼슘으로서 49.93 mg, 인으로서 38.58 mg)	169.5 mg
우르소데옥시콜산(KP)	10 mg
콘도이틴셀페이트나트륨(KP)	50 mg
로알젤라(생구)10-히드록시-2-데세노인산으로서 0.4 mg)	10 mg
• 첨가제 : 정질무수구산, 미결정셀룰로스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이벨간색(200F650003), 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로오스나트륨, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로스	

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 A, D, E, B₆, B₁₂, C의 보급

- 육체피로 - 임신수유기 - 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같다. • 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방
- 말초혈행장애 및 경년기 시 다음 증상의 완화: 어깨목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 • 각기 • 눈의 피로

○ 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 일부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcomatosis: 원인을 알 수 없는 전신 염종결핵, 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 월경병 5) 신장(콩팥)결석 환자 6) 심한 증상의 신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경우용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이

배설되는 상태) 3) 입부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형 발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 4) 소화성궤양, 만성궤양상대장염, 국한성(특정 부분에만 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장순환기계기능 장애 환자 6) 신장(콩팥)장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 감성배당체를 투여 중인 환자 9) 담낭(쓸개) 관련 질환, 간질환 환자 10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 12) 입부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 상복부 통증, 혼수, 붉은 반진, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 폐부종(부기), 흉반, 두드러기, 습진, 반구진성 발진, 부종(부기), 부종(부기) 수분저류(신부전 또는 심부전 환자) 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 많이 정지 않아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 10) 장기간 고용량의 비타민 E(비타민E로부터 전환된 것을 제외함) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈연성증) 위험을 높일 수 있다. 11) 항알도스테로제, 트리암테네과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 12) 우발적으로 과량복용 한 경우 13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것 2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다. 4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 6) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 120정/상자(60정/병×2), 60정/병

※ 본 의약품은 KGMF(의약품제조 및 품질관리기관)직접검사에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com)나 전화(080-497-8273)로 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보 시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요. ※ 부작용 이해구체 신청 : 한국약물관리안전관리원 (1644-6223, 14-3330) • 작성일자: 2024. 09. 11

[판매처]

Daewon 대원제약(주)

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제암공단1길 24

[제조처]

(유)한동제약

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주신단6로 301, 봉동로 705

V0000