

건 명	그린노즈플러스 연질캡슐 인서트		
규 격 (가로x세로)	120x200mm	Q A	음성
		표시문안	7pt
색 상	먹 1도	후 가 공	
업체제작일	2024.10.11.	작 업 처	(주)트리스톤

주 요 변 경 내 용	1. 신규 작성 2. 관리번호 변경
-------------------	------------------------



칼선 PANTONE 185C

※ 인쇄진행시, 인쇄사양과 다를경우
독심자로 즉시 연락주시기 바랍니다.

일반의약품

콧물, 코막힘, 재채기에 효과빠른

그린노즈플러스
연질캡슐

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1 캡슐 중

유효성분 : 벨라돈나총알칼로이드(총알칼로이드)로서 0.20 mg(JP) 0.20 mg
카페인무수물(JP) 25.00 mg
클로르페니라민말레산염(JP) 4.00 mg

첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축), (돼지, 가축)

첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호

기타 첨가제 : 농글리세린, 부틸하이드록시톨루엔, 산화티탄, 소르비톨소르비탄액, 정제수, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜4000, 프로필렌글리콜

[성상] 흰색의 내용물을 함유한 연두색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 매 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 만 3개월 미만의 영아(정맥이)
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항장신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복액(감기약, 진해거담제, 말미약, 알레르기용약 등)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 전신 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 심장질환, 녹내장에 : 눈의 통증, 눈이 침침한 등), 배뇨(소변)를 늦추는 등)이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 고령자(노인)
- 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 8) 이 약은 황색4호(타르자린)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
출혈성뇌출중, 구역·구토, 목미(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변)를 늦추는 등), 두통, 안면홍조 (붉어짐), 비정상적인 눈부심
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 속(나팔락시)과(만성소크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐/PTP

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이

지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자(2024년 9월 26일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.gcbiopharma.com)나 소비자상담실(080-260-0033)로 문의하시기

바랍니다.

제조의뢰 및 판매자

GC 독심자

(주)독심자

충청북도 음성군 금왕읍 무곡로65번길 26

TEL.031)506-4300 FAX.031)506-4303

www.gcbiopharma.com

제조사

코스맥스파마(주)

충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

설명-10-1633-1