

올대원맥스정 설명서
컬러 : 먹1도(양면인쇄)
버전 : V.0000

설명서
101 x 186

설명서 (전면)



일반의약품

[성분·함량] 1정 중

• 유효성분 :

푸르셀티아민(KP)	60 mg
벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 21.69 mg)	30 mg
비스벤티아민(KP)(티아민염산염으로서 17.5 mg)	20 mg
리보플라빈(KP)	90 mg
리보플라빈부티레이트(KP)(리보플라빈으로서 5.73 mg)	10 mg
니코틴산아미드(KP)	30 mg
판토텐산칼슘(KP)	200 mg
피리독신염산염(KP)	90 mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	10 mg
폴산(KP)	0.5 mg
메코발라민(KP)	1 mg
d-비오틴(USP)	0.5 mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민 D로서 1000 IU)(동물유래성분 : 양, 양모)	10 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 100.14 mg)	166 mg
산화아연(KP)(아연으로서 15.02 mg)	18.7 mg
우르소데옥시콜산(KP)	30 mg

• 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이벨간색 (200F650003), 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 발육기
- 노년기

- 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요하리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로

○ 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유헤중증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자

설명서 (후면)

- 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥)장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 - 7) 임부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
 - 2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용[함께 복용(사용)]투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 120정/상자(60정/병×2), 60정/병

※ 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com)나 전화(080-497-8273)로 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330) • 작성일자: 2024. 09. 11

V.0000

[판매자]

Daewon 대원제약(주)

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24

[제조자]

(유)한풍제약

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705