

마그비[®] 이엑스 EX 연질캡슐

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중


■ 유효성분

산화마그네슘(KP)	362.7mg (마그네슘으로서 218.75mg)
아스파르트산마그네슘수화물(DAB)	25mg (마그네슘으로서 1.69mg)
글리세로인산마그네슘(EP)	25mg (마그네슘으로서 3.13mg)
시트르산마그네슘(BP)	25mg (마그네슘으로서 4.04mg)
토코페롤아세이트(비타민E)(KP)	500mg (비타민 E로서 500IU)
시아노코발라민(비타민B12)(KP)	0.5mg
셀레늄함유건조효모(KP)	76.92mg (셀레늄으로서 100µg)
감마-오리자놀(KP)	5mg
작약엑스산(생규)	20mg
감초엑스산(생규)	10mg

■ 첨가제(동물유래성분): 숙신산칼라틴(기원동물: 돼지, 사용부위: 가죽)

■ 기타 첨가제: 레시틴, 농글리세린, 아자경화유, 황납, 공기름, 산화티탄, 카카오색소

【성상】 황갈색의 내용물을 함유한 갈색의 장방형 연질캡슐



【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 E의 보급

- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

● 비타민E(토코페롤아세이트):

말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족(손발)저림·수족냉증(손발이 차가움)

○ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

○ 셀레늄의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

※ 그림과 같이 캡슐포장의 뒷부분을 화살표 방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다. 이때, 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.



【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 태어난 지 3주 이내 마우스 및 랫트에 아스파르트산으로 250 mg/kg 이상을 투여하면, 시상하부 공상핵에 병리조직학적 변화를 확인했다는 보고가 있으므로 미숙아, 신생아, 젖먹이에게는 투여하지 않은 것이 바람직합니다.
- 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 4) 심장-순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 임부

- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감(배가 거북함), 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 구토
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 빨리지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
- 3) 클리시리진산으로서 1일 최대 40 mg을 함유하는 제제는 장기 연용(계속 복용) 할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 부종(부기), 나트륨저액의 저류(고임), 체중증가 등 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용하십시오.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 5) 지방과 부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관 하시기 바랍니다.

【사용기한】 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.

예) 제조번호 #25001, 사용기한 2027년 1월 1일인 경우 → "25001 2027.01.01"으로 표시

【포장단위】 60 캡슐/상자(10캡슐/PTP×6), 120 캡슐/상자((10캡슐/PTP×6)×2)

- ※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결 기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일: 2024년 9월 27일



제조의뢰·판매자

유한양행

본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74

공장: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr

소비자상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)

제조자: (주)알피바이오

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60 (1층, 2층일부, 3층일부)