


규격(mm) : 138 X 175 K = 100 / 1도

34,5mm

34,5mm

디코진 정 240밀리그램 (은행엽건조엑스)



35mm

[일반의약품]

디코진 정 240밀리그램 (은행엽건조엑스)

【원료약품 및 분량】 이 약 1정 중,
유효성분 : 은행엽 건조엑스(EP).....240mg
첨가제 (동물유래성분) : 유당수화물(소-우유)
첨가제 (타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호
기타 첨가제 : 마결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드
라이QX녹색(321A610008), 오파드라이EZ클리어(253U190
007), 옥수수전분, 폴로이드성이산화규소, 크로스카르멜로오
스나트륨, 텔크

【성상】 녹색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상
이 동반되는 정신 기능 저하

【용법·용량】

성인
은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용합니다.
식사와 관계없이 복용할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.
1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있
는 환자
2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 총
분하지 않습니다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년
에게 사용해서는 안 됩니다.
3) 임신부
4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(gala
ctose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lacta
se deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-g
alactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 항응고제(예: 펜프루쿰온, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살
리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복

용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없습
니다.

2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2,
2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것
을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수
있습니다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아젬과 같은 칼슘채널차단제와
병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로
써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있습니다. 경구용 테
오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으
로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있습니다. 따라서 주의깊게
모니터링하고 용량을 조절해야 합니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의 사, 약사와 상의하십시오.

- 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사
용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 합니다.
2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않았습니.)
3) 이 약을 복용(사용)하여 간질 환자의 추가 발작이 촉진되는 것
을 배제할 수 없습니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로
안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단
해야 합니다.
2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되
어야 합니다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악
화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 합니다.
3) 이상반응
· 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.
· 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
· 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예 : 피부 홍반(붉은 반점), 부어
오름, 가려움증). 알레르기성 쇼크가 있을 수 있습니다.
경기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었습니다.
4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과,
이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계
적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니

다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

· 어지러움
· 가려움증

5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있습니다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

5. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【포장단위】 30정/병, 500정/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 구입시 유효기한·사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자를 통하여 본사 영업부(TEL 031-781-9081/9)에서 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항은 동봉한 설명서 또는 홈페이지를 참조하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 본사 영업부/개발부(TEL 031-781-9081/9) 또는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다

※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품 안전관리원 (1644-6223)

※ 의사나 약사께서는 이상반응을 예방하고 올바른 약물 사용을 위해 약물사용 전 다음 사항을 반드시 읽고 숙지하십시오.

1. 환자에게 투약하기 전 반드시 설명서를 주의 깊게 읽고 필요한 사항은 환자에게 복약 지도합니다.
2. 용법, 용량을 확인하고 투약하십시오.
3. 습기와 열원을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
4. 오용을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
5. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-2200

제조의회사 : **국제약품[주]**

경기도 안산시 단원구 산성로 47
www.kukjepharm.co.kr

제조사 : **중림무약(주)**

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

작성일 : 2024년 10월 22일
ETBK21-25-01