

<LOW> 윤기마무리어

<LOW> 윤기마무리어

<조제용>(일반의약품)

마이칼디 미니정

【원료약품 및 그 분량】 1정(656밀리그램) 중

- 유효성분 : 시트르산칼슘수화물(USP)569.50밀리그램
(칼슘으로서120밀리그램)
시아노코발라민(USP) 0.25밀리그램
콜레칼시페롤농축물(분말형)(EP)2.00밀리그램
(비타민D로서 2000아이.유)
폴산(USP)0.125밀리그램
- 첨가제(타르색소) : 청색2호 알루미눔레이크
- 기타 첨가제 : 카르바우바넵, 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭실드노란색(11Y824), 크로스포비돈, 포비돈, 콜로이드성이산화규소, 탈크, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘

【성 상】 황갈색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】


1. 다음 경우의 비타민 D의 보급 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다
- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
3. 칼슘 결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법·용량】

12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 2정 복용

【사용상의 주의사항】

- (1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유훈증증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3) 12개월 미만의 영아
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
- (2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계제 제제, 제산제



(3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 감심배당체를 투여중인 환자
- 7) 신장결석 병력이 있는 환자

(4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진
- 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
- 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 4) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

(5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

(6) 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

【포장단위】 240정/병

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품의 상세정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 피해구제 상담(14-3330), 의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담(1644-6223)

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805(무료전화서비스)

제조 · 판매자

 **명문제약주식회사**

경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26

www.mmp pharm.co.kr

〈작성 연월일 : 25. 07. 09〉

〈M01〉