

일반의약품

생약성분 감기 치료제 조당은교산캡슐

※ 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



원료약품 및 분량

【유효성분】 1캡슐(612mg) 중

금은화(KP)	710mg
연교(KP)	710mg
박해(KP)	426mg
갈강(KP)	426mg
간초(KP)	426mg
금죽암(상규)	284mg
향개(KP)	284mg
두시(생규)	356mg
우방재(KP)	356mg
영양각(상규)(동물유래성분 : 영양, 풀)	22mg
이성물간조엑스	500mg

【참가제】

참가제(티르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호

참가제(동물유래성분) : 유당수화물소, 우유

기타참가제 : 스테이르산마그네슘, 옥수수전분, 폴리비드성인산화규소, 캡슐

【성상】 갈색의 분말이 충전된 상부 주황색 불투명, 하부 미황색 불투명의 경질 캡슐제

【효능·효과】 감기로 인한 복통, 두통, 목아픔, 기침, 두통

【용법·용량】 보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사이후) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 5세 미만의 영(경)아가 · 유아

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 고혈압 환자

2) 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자

3) 부종(부기) 환자

4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)

5) 위장이 허약한 환자

6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(홍창)되어 불어짐, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자

7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

9) 고혈압(노인)(일반적으로 고혈압(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감탕(출임)하는 등 주의할 것.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상환시기능한한이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위암·도스타트론증 : 요양이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고압, 쌍임), 부종(부기), 체중증가 등의 위암·도스타트론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치)의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

(2) 근병증(근육병증) : 자발적(자발)의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감,

사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(3) 피부 : 발진·발적(홍창)되어 불어짐, 가려움 등

(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등

2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항.

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.

4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 클리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리아클로로메타이드와 병용(함께 복용(사용)) 시 위암·도스타트론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

5) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용·잘못·사용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10캡슐/피티파, 20캡슐/상자(10캡슐/피티파x2), 500캡슐/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제제는 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처의 의약품통합정보시스템(medicines.go.kr)을 참조 하세요.

※ 내용 외 부작용이나 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고, 부작용 보고 및 피해구제신청은

한국국약품안전관리원(1644-6223) 및 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에서 할 수 있습니다.

※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화(02-2206-3800)에서 확인할 수 있습니다.

【소비자 상담전화】 080-302-3000(수시자 부담)

【제조일자 및 판매처】 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 병방로 381

【제조자】 경방신약(주) 인천광역시 남동구 남동대로 394

총청남도 금산군 부리면 인삼약초공단로 27

작성연월일: 2024. 12. 19

CHODANG
PHARM