

안전한 염증완화제 멜라트리정 (브로멜라인, 결정트립신)

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분 : 브로멜라인(KP) 40 mg
(20,000브로멜라인 단위)
결정트립신(USP) 1 mg
(2,500USP트립신 단위)
- 동물유래성분 : 결정트립신소, 헤징(이자)
- 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스, 산화티탄

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화 : 수술 및 외상(상처)후, 유입물체(젓고임)

【용법·용량】

- 성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.
- 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈액응고이상 환자
- 2) 심한 간장애 또는 신장애(신장장애) 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유효성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)
- 4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용(사용))투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 과민반응 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장 단위】 10 정/피티피, 100 정/피티피(10정/PTP X 10)

【저장 방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조업체】 (주)바스칸바이오제약 / 경기도 안성시 원곡로 원당로 354

【제조자】 정우신(약주) / 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(nedrug.mds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900

작성일 : 2024. 10. 21. (Rev.0)