



말초동맥순환장애 치료 깡코라민정 240mg (은행엽건조엑스)

【원료약품 및 그 분량】1정 중
■ 유효성분 : 은행엽 건조엑스(EP) -----240mg
■ 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호
■ 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소-우유)
■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이EZ 클리어253U190007, 오파드라이QX녹색(321A610008), 옥수수전분, 콜로이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 셀크

【성상】녹색의 장방형 필름코팅정제

【효능효과】집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(어지러움)(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

【용법용량】성인 : 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다.
식사와 관계없이 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
3) 임신부
4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
1) 항응고제(예: 펜프로쿰온, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것

을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아젠크와 같은 칼슘채널차단제와 병용 투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있다. 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 한다.
- 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
- 이 약을 복용(사용)하여 간질 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
- 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.
- 이상반응
· 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.
· 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
· 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증), 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다. 장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.
4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
· 어지러움
· 가려움증

5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

5. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에게는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관
【포장단위】30정/병, 500정/병
【사용기한】외부포장 참조
【제조자】풀림무약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120
【제조회자】㈜마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
※ 작성일자(2024.10.11) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2024년 10월 11일

40년 이상 엄마의 마음으로 여러분의 건강을 지켜온
(주)마더스제약 Since1974 -
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

》 접지 시

 Total Printing
성신문화사 북라벨·메뉴얼·이중라벨 전문
서울시 중구 마른내로 2길 17 성신빌딩 TEL 02-2263-0621
[www. booklabel.co.kr](http://www.booklabel.co.kr) | www.북라벨.com

업체명	마더스제약(풀림무약)
제품명	깡코라민정(240mg)
규격	138×175mm
인쇄도수	양면 먹 1도 ■
원단사양	캠퍼스지 50g
단수/접지규격	4×5 단 / 35×35mm
서체	7pt (본문 7pt 이상)
폴림방향	좌측(머리)폴림
버전번호	2024.10.11
작성자	장수현 주임 (2024.10.24)

- 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.
- 전화번호, 주소 등 중요내용 반드시 확인해주세요.
- 빠진글자, 틀린글자, 위치 확인해주세요.
- 같은 데이터라 할지라도 인쇄할 때마다 색상차이가 날 수 있습니다.
- 색상이 진하고(+5~10%) 흐림 정도(-5%~10%)로는 재작업이 될 수 없습니다.
예를 들면 지난번에는 조금 진하게 인쇄되고 이번에는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10%~20%정도로 고객님의께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.

※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다.
정확한 검토 부탁드립니다.

※ 최종파일 전 시안확인을 원칙으로 하며, 고객님의 시안 승인 후 진행되는 인쇄 결과물에 대하여 완성된 제품은 당사에 책임이 없음을 고지합니다.