

디오프로 정

600밀리그램 (디오스민)

작성연월일 - 2024.09.20

디오스민 최대함량 제제*

제품명

디오프로정 600밀리그램(디오스민)

원료약품 및 그 분량

1정(780mg) 중

- 유효성분 - 디오스민(EP) 600mg
- 첨가제 - 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이EZ클리어 (253U190007), 오파드라이분홍색(03B640092), 저지환 도하드록시프로필셀룰로오스

성상

분홍 또는 연분홍의 장방형 필름코팅정제

효능/효과

- 치질과 관련된 징후의 치료
- 정맥부전과 관련된 증상의 개선 - 다리 중압감, 통증
- 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료

용법/용량

- 치질 - 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2-3회(1,200mg~1,800mg) 식사 시 복용한다.
- 정맥부전 - 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사 시 복용한다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자 | 2) 수유부
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.
이 약은 오랜기간 투약하지 말아야 한다.
증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

저장방법

밀폐용기, 실온보관(1-30°C)

포장단위

30정/병, 60정/상자(30정/병*2)

- 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- 구입 시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해드립니다.

부작용 보고 및 피해구제 신청

1644-6223(한국의약품안전관리원)
14-3330(피해구제신청 전용번호)

판매자

한국바이에른(주) | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 58

제조의뢰자

케이엠에스제약(주) | 경기도 수원시 영통구 신원로 236

제조사

풍림무약주식회사 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120