[제조의뢰자] 한솔신약㈜ / 충청북도 음성군 금왕읍 청평길 2-11
[제조자] ㈜노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53
[판매자] ㈜데이팜 / 광주광역시 북구 자라봉로 63번길 26

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

8 806458 044526 >

제조번호 :
사용기한 :

HIP'S+ 일반의약품 | KGMP적격업체

위장관 운동 조절제

메라부틴정

(트리메부틴말레산염100mg)

위장관 기능조절 | 과민성 대장 증후군 | 기능성 소화불량

20정

1회 1~2정, 하루 3번

위장관 운동 조절제
메라부틴정
(트리메부틴말레산염100mg)

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
※ 본 제품의 기타 자세한 정보는 본사 (043)881-6333으로 문의하시거나 또는 의약품통합정보 시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223,14-3330)

개정연월일 : 2026.06.10

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

[유효성분] 1정(255.0 mg) 중

트리메부틴말레산염(KP) ····· 100 mg

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과]

1. 주효능 효과

1) 식도역류 및 열공(구멍, 틈새)헤르니아(탈장), 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화 기능 이상(복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토)
2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관(창자) 통과 장애(변비, 설사)

[용법·용량] 성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg, 1일 3회 식전에 경구투여한다(먹는다, 복용한다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 이상반응

1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내(입안)마비감 등이 나타날 수 있다.
2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다. 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다. 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

2. 임부에 대한 투여
임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돎, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3. 수유부에 대한 투여
수유 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유 중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

[포장단위] 20정 / 피티피

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용기한] 용기 측면 표시일까지(순서-연.월.일)

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스