

징코에프정 240밀리그램

(은행엽건조엑스)

일반의약품

HT-241122
GINKGO-F Tab

일반의약품

징코에프정 240밀리그램

(은행엽건조엑스)

일반의약품

HT-241122
GINKGO-F Tab

[원료약품의 분량] 1정 중
 유효성분: 은행엽건조엑스(EF)-----240mg
 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색203호
 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 오파드
 라이QX녹색(321A610008), 크로스카르멜로오스나트륨, 콜
 로이드성아산화규소, 멜크

[성상]
 녹색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]
 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는
 정신 기능 저하

[용법·용량]
 성인
 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다.
 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다.
 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
 3) 임신부
 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose
 intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)
 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)
 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 은행고제에: 펄프루코분, 와라린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및
 기타 비스테로이드성 항염증제를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경
 유, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시트코콜 P450, 3A4, 1A2, 2E1,
 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제
 할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약
 을 니페디핀 및 딜티아젠크 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복

일반의약품

징코에프정 240밀리그램

(은행엽건조엑스)

일반의약품

HT-241122
GINKGO-F Tab

[원료약품의 분량] 1정 중
 유효성분: 은행엽건조엑스(EF)-----240mg
 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색203호
 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 오파드
 라이QX녹색(321A610008), 크로스카르멜로오스나트륨, 콜
 로이드성아산화규소, 멜크

[성상]
 녹색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]
 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는
 정신 기능 저하

[용법·용량]
 성인
 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다.
 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다.
 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
 3) 임신부
 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose
 intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)
 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)
 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 은행고제에: 펄프루코분, 와라린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및
 기타 비스테로이드성 항염증제를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경
 유, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시트코콜 P450, 3A4, 1A2, 2E1,
 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제
 할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약
 을 니페디핀 및 딜티아젠크 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복

일반의약품

징코에프정 240밀리그램

(은행엽건조엑스)

일반의약품

HT-241122
GINKGO-F Tab

[원료약품의 분량] 1정 중
 유효성분: 은행엽건조엑스(EF)-----240mg
 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색203호
 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 오파드
 라이QX녹색(321A610008), 크로스카르멜로오스나트륨, 콜
 로이드성아산화규소, 멜크

[성상]
 녹색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]
 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는
 정신 기능 저하

[용법·용량]
 성인
 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다.
 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다.
 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
 3) 임신부
 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose
 intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)
 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)
 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 은행고제에: 펄프루코분, 와라린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및
 기타 비스테로이드성 항염증제를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경
 유, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시트코콜 P450, 3A4, 1A2, 2E1,
 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제
 할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약
 을 니페디핀 및 딜티아젠크 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복

일반의약품

징코에프정 240밀리그램

(은행엽건조엑스)

일반의약품

HT-241122
GINKGO-F Tab

[원료약품의 분량] 1정 중
 유효성분: 은행엽건조엑스(EF)-----240mg
 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색203호
 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 오파드
 라이QX녹색(321A610008), 크로스카르멜로오스나트륨, 콜
 로이드성아산화규소, 멜크

[성상]
 녹색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]
 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는
 정신 기능 저하

[용법·용량]
 성인
 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다.
 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다.
 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
 3) 임신부
 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose
 intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)
 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)
 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
 1) 은행고제에: 펄프루코분, 와라린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및
 기타 비스테로이드성 항염증제를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경
 유, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시트코콜 P450, 3A4, 1A2, 2E1,
 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제
 할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약
 을 니페디핀 및 딜티아젠크 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복

일반의약품

징코에프정 240밀리그램

- ※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 약품용은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7900)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 이 첨부서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국오텍스제약(주) 홈페이지(www.huteecs.co.kr) 또는 식품약품안전처 약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기간이 지난 약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작용용 피해구제신청 : 한국약품안전관리원 ☎1644-6223, ☎14-3330)

[제조사] 풍림무악(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

[제조의뢰자] 한국휴텍스제약(주) 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93
4층일부, 1층일부(보관소)

HT-241122
GINKGO-F Tab.
최종개정일자 : 2024. 11. 22

>> 접지 시

일반의약품
징코에프정 240밀리그램
 (은행엽건조엑스)

	성신문화사 북라벨·메뉴얼·이중라벨 전문 서울시 중구 마른내로 2길 17 성신빌딩 TEL. 02-2263-0621 www.booklabel.co.kr www.북라벨.com
업체명	한국휴텍스제약(풍림무약)
제품명	징코에프정240밀리그램(은행엽건조엑스)
규격	138×175mm
인쇄도수	먹 1도 ■
원단사양	캠퍼스지 50g
단수/접지규격	4×5 단 / 35×35mm
서체	7pt (본문 6pt 이상)
폴림방향	폴림방향확인
버전번호	2024.11.22
작성자	권유나 사원(2024.12.03)

1. 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.
2. 전화번호, 주소 등 중요내용 반드시 확인해주세요.
3. 바진글자, 틀린글자, 위치 확인해주세요.
4. 같은 데이터라 할지라도 인쇄할 때마다 색상차이가 날 수 있습니다.
5. 색상이 진하고(+5~10%) 흐림 정도(-5%~10%)로는 제작업이 될 수 없습니다.
 예를 들면 지난번에는 조금 진하게 인쇄되고 이번에는 조금 흐리게 인쇄되었다면
 그 편차는 10%~20%정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.

※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에게 없음을 고지합니다.
정확한 검토 부탁드립니다.

※ 최종파일 전 시안확인을 원칙으로 하며, 고객사의 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 완성된 제품은 당사에 책임이 없음을 고지합니다.