

담 당	제일약품 홍보실	사 이 즈	101x186mm
제 품 명	투엑스비멀티플정설명서	최종수정날짜	2024.7.16
인 쇄 업 체		특 이 사 항	
컬 러			

1EZ-B-H000-243-01

일반의약품

분류번호 : 319

2XB

Multiple

강한 피로엔 강한 비타민

국내 최초* 31가지 성분 함유

피로를 강하고 빠르게! 필수영양소를 하루 한알로!

투엑스비멀티플정

[원료약품 및 분량] 1정 중

유효성분 :

■ 벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 21.69 mg)	30 mg
■ 푸르실티아민(KP)	20 mg
■ 리보플라빈(KP)	20 mg
■ 니코틴아미드(KP)	20 mg
■ 피리독신염산염(KP)	20 mg
■ 리보플라빈부티레이트(KP)(리보플라빈으로서 5.73 mg)	10 mg
■ 시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 15 µg)	15 mg
■ 셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 12.42 µg)	23 mg
■ 침강탄산칼슘(KP)(칼슘으로서 8.01 mg)	20 mg
■ 황산망간수산화물(USP)(망간으로서 4.88 mg)	15 mg
■ 무수인산수소칼슘(JP)(인으로서 11.38 mg, 칼슘으로서 14.73 mg)	50 mg
■ 토크페롤아세테이트2배산(KP)(비타민 D로서 25 IU)	50 mg
■ 산화아연(KP)(아연으로서 24.1 mg)	30 mg
■ 산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 15.08 mg)	25 mg
■ 푸마르산철(KP)(철로서 4.93 mg)	15 mg
■ 제피타스코르브산(별규)(아스코르브산으로서 100.01 mg)	103.1 mg
■ 이노시톨(KP)	30 mg
■ DL-메티오닌(KP)	10 mg
■ 콘드로이틴설페이트나트륨(KP)(동물유래성분 : 소, 연골)	50 mg
■ 유비테카레논(KP)	10 mg
■ 비스벤티아민(KP)(티아민염산염으로서 4.37 mg)	5 mg
■ 타우린(KP)	100 mg
■ 황산제이구리수산화물(USP)(구리로서 2.55 mg)	10 mg
■ D-비오틴(USP)	0.25 mg
■ 폴산(KP)	0.25 mg
■ 메코발라민(KP)	0.5 mg
■ 판토텐산칼슘(KP)	50 mg
■ 콜린타르타르산염(별규)	20 mg
■ 클레칼사피롤농축분말(EP)(비타민 D로서 1000 IU)(동물유래성분 : 양, 양모)	10 mg
■ 우르소데옥시콜산(KP)	10 mg
■ 감마-오리자놀(KP)	10 mg

[첨가제]

경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파이드라이벨칸색(200F650003), 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로오스나트륨, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성 상] 적색의 타원형 필름코팅정



[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시 - 발육기 - 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

· 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 · 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허)리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 · 각기 · 눈의 피로

2. 아연의 보급

[용법·용량] 만 15세 이상 성인 : 1일 1회, 1회 1정을 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 철 함유 제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 월슨병 5) 철색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈 6) 신장(콩팥)결석 환자 7) 심한 증상의 신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 오줌에 과량의 옥살염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장·순환기계기능 장애 환자 6) 신장(콩팥)장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 강심배당체를 투여 중인 환자 9) 담낭(쓸개) 관련 질환, 간질환 환자 10) 동풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 12) 임부 13) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증, 췌장염 등 지방 대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 및 임부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 고령자(노인)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부(배부분)·위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부 통증, 붉은 반점, 부전수축(심장박동지정), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡기 악취, 탈모, 조근증, 위장관장애, 소화장애, 폐부종(부기), 흉반, 습진, 반구진성 발진, 부종(부기), 부종(부기)·수분저류(신부전 또는 심부전 환자), 복부(배부분)불쾌감 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고옥살혈증(hyperurisemia, 혈액중에 옥산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 정기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 10) 항일도스테로이드, 트리암데린과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 11) 우발적으로 과량복용 한 경우 12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜 것 2) 각종 오 검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30 ℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30정/병, 60정/병, 90정/병, 120정/상자(60정/병×2), 180정/상자(90정/병×2)

[소비자상담실] 080-549-0002 / www.jeilhs.co.kr

※ 본 의약품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약품을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오. ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
설령사작성년월일 2024.09.26

[판매원]

제일헬스사이언스(주)

경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 B동

* 2024년 09월 23일 허가 기준(식약처)

[제조원]

(유)한풍제약

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로705