

건조하고 피로한 눈엔 눈 영양제

일반의약품

아이코드에이

연질캡슐

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

【유효성분】 이 약 1캡슐(975mg) 중

***유효성분**

간유(USP)	-----	500mg(비타민A으로서 500IU.)
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	-----	25mg
티아민질산염(KP)	-----	10mg
리보플라빈(KP)	-----	5mg
토코페롤아세테이트(KP)	-----	25mg(비타민E으로서 25IU.)

* 첨가제(동물유래): 숙신산젤라틴(소, 가축내피)

* 첨가제(기타): 경화유, 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 치차청색소

【성상】 주황색의 내용물을 함유한 청색의 타원형 연질캡슐제

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 A, E, B₁, B₂의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민A(간유): 눈의 건조감의 완화
 - 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
 - 비타민E(토코페롤아세테이트): 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 비타민B₁(티아민질산염): 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의피로
 - 비타민B₂(리보플라빈): 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.

- 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 묽은 변, 변비, 설사, 식욕부진, 홍반(붉은 반점), 두드러기, 습진, 발진, 발적, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기), 부종(부기)·수분저류(고임)(신부전 또는 심부전 환자)

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.

- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.

- 4) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈엉성증) 위험을 높일 수 있습니다.

- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우

- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관하십시오.

【포장단위】 120캡슐, 240캡슐

【사용기한】 케이스 별도 표시일 참조

【제조사】 (주)서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

【판매자】 (주)유한메디카 / 서울특별시 동작구 노랑진로 74, 유한양행 빌딩 6층

【소비자 상담실】 02-834-1745

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품정보를 참조하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품 안전관리원(1644-6223) 또는 14-3330

※ 문서작성일 : 2025.07.08.

※ 문서번호 : 01-250708