

일반의약품

수정
횟수

08

수정일	2025.02.10
제품명	비파인맥스정
분류	설명서
규격(mm)	140×200
후가공	
수정코드	P2501-01
COLOR	 4도

특이사항 70모조

※ 반드시 수정일 경우 수정코드 적용바랍니다.
 EX) OTC/ETC(P2301), 건식(IYF2301)

※ 문의사항 : 02)570-3844(홍보팀)


일양약품
 서울특별시 강남구 도곡로 194

디자인사양은 반드시 좌측상단에 배치바랍니다.

일반의약품

고함량 활성형 비타민

일양약품

비파인맥스정
MAX

B

[원료약품 및 그 분량] 1정(891mg) 중

· 유효성분 :

베포티아민(KP)(티아민염산염으로서 72.31mg)	100mg
리보플라빈부타레이트(KP)	15mg
니코틴산아미드(KP)	100mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	5mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg
메코발라민(KP)	1,000µg
D-비오틴(USP)	0.5mg
아노시톨(KP)	30mg
아스코르브산(KP)	100mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민E로서 20 I.U.)	40mg
폴산(KP)	0.5mg
클레칼시페롤농축분말(EF)(비타민D로서 1,000 I.U.)	10mg
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 13.5µg)	25mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 18mg)	30mg
산화아연(KP)(아연으로서 16mg)	20mg
유비데카레논(KP)	5mg
감마-오리자놀(KP)	5mg
우르소데옥시콜산(KP)	10mg

· 첨가제(기타첨가제) : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭설드갈색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[효능 · 효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로 - 임신 - 수유기 - 병중 - 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

· 뼈, 이의 발육 불량 · 구루병의 예방 · 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 · 각기 · 눈의 피로

2. 아연의 보급

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 중상의 신부전 환자
- 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

- 4) 소화장애, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥) 장애환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 10) 입부
- 11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
4. 다음과 같은 경우 1) 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부(배부부)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능장애, 피부부, 땀 · 호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부부)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구약(예, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)증 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독삼을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 골량이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10ug 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 7) 흡연자 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대장부여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 9) 고콜레스테롤, 트리글리세리드, 트리아실글리세리드, 중성지방(지방)이 과잉인 경우, 특히 고콜레스테롤을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1) 1개월 정도 과량복용도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전 후에는 피할 것.
6. 일반적 주의
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지질의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
- 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
7. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오일(유포) 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- [저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1 ~ 30℃)
- [사용기간] 제조일로부터 36개월
- [포장단위] 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)
- [첨부문서 작성 연월일] 2025.02.13(Rev.01)

- ※ 본 제물은 엄격한 품질관리를 통한 제물입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패, 오염되거나 손상된 제물은 교환가설치 또는 약물관 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 「소비자분쟁해결기준」에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 약물은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 약물을 사용하기 전에 첨부서류 내의 고지 사항이 하며, 첨부서류를 약물관과 함께 보관하십시오.
- ※ 최초 처방정원일(2025.02.13) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처(www.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 약물관 부속을 읽고 및 구매구제 신청 : 한국약물관안전관리원(644-6223 혹은 14-3330)

【판매자】

일양약품주식회사

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
홈페이지 www.ilyang.co.kr

【제조자】

Medix 메딕스제약

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170