

[색상에 유의하여 인쇄 바랍니다]

디자인 사양		자재명	올틴정5mg_설명서
주의사항 1. JPG 파일(그림파일)이나 PDF파일을 첨부하오니 그림유실, 데이터 오류 등 체크해 주시기 바랍니다. 2. 감리 일자는 일주일 전 협의바랍니다. 3. 감리를 가지 않을 경우 사전에 담당자와 협의하여 사진을 통해 인쇄 상태를 확인 할 수 있어야 합니다. 4. 파일에 문제가 있을 시 임의 변경 하지 마시고 연락 주시기 바랍니다. 5. 인쇄도수에 'P'를 표기한 경우 'PANTONE'을 의미합니다.	최종수정일	2024.10.16	
	규격(장폭고)mm	160*297mm	
	재질	모조지 70g	
	양면여부	단면인쇄	
	비고	-	
	위 사항을 지키지 않아 발생하는 문제는 본사에서 책임지지 않습니다.		문의전화
인쇄도수			
1도			

모발 성장을 위한

올틴TM정 5mg

— 비오틴 —

AlltinTM Tab. 5mg

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

유효성분: 비오틴(USP) 5 mg

동물유래성분: 유당수화물(소/우유)

기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨

■ 성상 : 흰색의 원형 정제**■ 효능 · 효과**

비오틴 결핍으로 인한 손 · 발톱 또는 모발 성장 장애

■ 용법 · 용량

1일 1회 1정, 식사전 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 날계란 흰자와 비오틴이 비가역적이며 약효가 없는 복합체를 형성하므로 날계란과 비오틴을 동시에 복용하지 않는다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임부, 수유부: 임신부 · 수유부가 복용한 경우에 대한 임상 연구는 제시되어 있지 않다. 또한 임신, 태아의 발달 단계, 태반의 발달 및 출생 후 과정에 미치는 영향에 관한 동물 연구도 충분히 이루어지지 않았다. 지금까지 임신부 복용에 있어서의 부정적인 영향에 대하여 알려진 바는 없지만 임신 중의 복용은 신중하게 이루어져야 한다. 또한 작용물질은 모유로 분비된다.
 - 항경련제 복용환자: 카르바마제핀, 페니토인, 페노바르비탈이 비오틴의 대사를 증가하여, 오랫동안 지속되는 항경련제 투여로 비오틴의 혈중농도 감소가 발생된다.
 - 항생제 복용환자: 항생제의 사용은 대장에 있는 박테리아에 의해 생성되는 비오틴을 감소시킬 수 있다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 두드러기, 위장장애
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.
 - 오남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관**■ 포장단위 : 30 정/상자(6 정/PTP X 5)****■ 제조원 : 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52**

※ 본 첨부서 문안 개정일자(2024년 10월 16일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자 부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 포장을 개봉하여 복용시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하시기 바랍니다.