

1850100

일반의약품

징코휴정 240mg

은행엽건조엑스

20mm

20mm

순환기용치료제

Ginkgohu Tab. 240mg

징코휴정 240mg

은행엽건조엑스

일반의약품

정

부

공

인

KGMP

우수약품 지정업체

※의약품을 사용하기 전에 본 문서를 자세히 읽어보시고 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분 : 은행엽 건조엑스(EP)..... 240 밀리그램
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이EZ클리어 253U190007, 오파드라이OX녹색(321A610008), 옥수수전분, 크로스카 멜로오스나트름, 콜로이드성아산화규소, 텔크

[성상]
녹색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]
집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

[용법·용량]
성인
은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용합니다.
식사와 관계없이 복용할 수 있습니다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.
1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않습니다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 됩니다.
3) 임신부
4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
1) 항응고제(예: 펜프로쿠몬, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들 의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없습니다.
2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있습니다. 이 약

을 니페디핀 및 딜티아젠크와 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있습니다. 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있습니다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 합니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 합니다.
2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
3) 이 약을 복용(사용)하여 간질 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없습니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오, 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 합니다.
2) 복용기간에 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 합니다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 합니다.
3) 이상반응

- 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.
- 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
- 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증), 알레르기성 쇼크가 있을 수 있습니다.

장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었습니다.

4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 어지러움
- 가려움증

5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있습니다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[포장단위] 병포장) 30정/병, 500정/병

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36 개월

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조(외)재] (주)휴비스트제약/ 대전광역시 대덕구 신일서로 104번길 46

[제조사] 풀림무약(주)/ 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

※ 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 참조하십시오.
※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비상담실(070-4481-6051)로 문의하시기 바랍니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

1850100
개정년월일: 2025.01.11

내일을 향한 희망 에너지

HUVIST

Huvist Pharm. Co., Ltd. (주)휴비스트제약
대전시 대덕구 신일서로 104번길 46
고객상담실 : 070-4481-6051 / www.huvist.co.kr

>> 접지 시

1850100
일반의약품
징코휴정 240mg
은행엽건조엑스

 **Total Printing** 성신문화사 **북라벨·매뉴얼·이중라벨 전문**
서울시 중구 마른내로 2길 17 성신빌딩 TEL 02-2263-0621
www.booklabel.co.kr | www.북라벨.com

업체명	휴비스트제약(풀림무약)
제품명	징코휴정 240mg
규격	138×175mm
인쇄도수	먹 1도 ■
원단사양	캠퍼스지 50g
단수/접지규격	4×5 단 / 35×35mm
서체	7pt (본문 6pt 이상)
폴림방향	봉함라벨쪽으로폴림
버전번호	2025.01.11
작성자	권유나 사원(2025.02.11)

- 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.
- 전화번호, 주소 등 중요내용 반드시 확인해주세요.
- 빠진글자, 틀린글자, 위치 확인해주세요.
- 같은 데이터라 할지라도 인쇄할 때마다 색상차이가 날 수 있습니다.
- 색상이 진하고(+5~10%) 흐림 정도(-5%~10%)로는 재작업이 될 수 없습니다. 예를 들면 지난번에는 조금 진하게 인쇄되고 이번에는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10%~20%정도로 고객님의게서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.

※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다.

정확한 검토 부탁드립니다.

※ 최종파일 전 시안확인을 원칙으로 하며, 고객사의 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 완성된 제품은 당사에 책임이 없음을 고지합니다.