

POT236I03-00
씨큐프리정240밀리그램
(은행엽건조엑스)

씨큐프리정240밀리그램 (은행엽건조엑스)

Cirqufree Tab. 240mg

일 반 의 약 품
조 제 용
분류번호 : 02190

- 원료약품 및 분량: 1정 (630 mg) 중
- 유효성분: 은행엽건조엑스 (생규) ~ 240.00mg
 - 첨가제 (타르색소): 청색1호, 황색203호
 - 첨가제 (동물유래성분): 유당수화물 (소·우유)
 - 기타 첨가제: 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카멜로오스나트륨, 탬실드녹색 (99G1033), 탈크, D-만니톨

■성 상
녹색의 장방형 필름코팅정제

■효능·효과
집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증 (동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

■용법·용량
은행엽건조엑스로서 1회 240 mg, 1일 1회 1정 복용한다. 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

- 사용상의 주의사항
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
- 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
 - 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
 - 임산부
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
- 항응고제 (예: 펜프로쿰온, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여 (함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
 - 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아젠크와 같은 칼슘채널차단제와 병용투여 (함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있다. 경구용 테오필린과 병용투여 (함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 한다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
- 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 한다.
 - 수유부 (모유로 이행여부가 알려지지 않음)
 - 이 약을 복용(사용)하여 뇌전증 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
 - 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.
 - 이상반응
 - 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.
 - 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
 - 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응 (예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증). 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다.장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.
 - 국내 자발적 이상사례 보고자료 (1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증

- 을 의미하는 것은 아니다.
- 어지러움
 - 가려움증
- 5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
5. 기타 **이약의 복용(사용)시 주의할 사항**
- 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.
6. **저장상의 주의사항**
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■저장방법: 기밀용기, 상온 (15~25℃) 보관

■사용기간: 제조일로부터 36개월

■포장단위: 30정/병, 300정/병


※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화070-4346-1213으로 주시기 바랍니다.
※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (https://nedrug.mfds.go.kr) 의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.
※ 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

개정연월일: 2024년 10월 14일

■제조사: 코스맥스파마(주) / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

■제조의뢰자: (주)넥스팜코리아 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

>> 접지 후 모습



날짜	2024년 11월 8일	기타	론타입	●재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ●전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ●빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ●같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님의께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다. ※ 수정된 원본 데이터는 제공되지 않습니다.
고객사	넥스팜코리아	색상	■ 먹색(K100) —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)	
제품명	씨큐프리정240밀리그램			
유형	매뉴얼팩			
인쇄	㉞양면 □단면			
규격	138×210mm (±2mm)			
접지규격	35×35mm	폰트	- 제품명 : 7포인트 이상 - 일반의약품 문구 : 7포인트 이상 - 본문 : 7포인트	
재질	캠퍼스지 50g			
관리번호	POT236I03-00			
※ 인쇄진행 전 시안 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 당사에는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.				

스티커 / 설명서 제작업체
I주I무궁화LNB 매뉴얼 **팩**