

|        |                      |            |
|--------|----------------------|------------|
| 학<br>인 | 디자인                  | QC(문안)     |
|        | 김관률<br>010-4756-4486 | 안재윤        |
| 날짜     | 2025.05.12           | 2025.05.12 |



DW PKG 인쇄사양서

|                                      |                      |        |
|--------------------------------------|----------------------|--------|
| product                              |                      |        |
| 제품명                                  | 이지엔6 예이스정 설명서(일반의약품) |        |
| 포장단위                                 |                      |        |
| size (장×폭×고)                         |                      |        |
| 155*180mm                            |                      |        |
| 종이재질                                 |                      |        |
| 모조70g/m2                             |                      |        |
| 코팅 (CR, 라미레이팅, UV 등)                 |                      |        |
| N/A                                  |                      |        |
| 후가공                                  |                      |        |
| N/A                                  |                      |        |
| 접착 (맞투경, 1면, 1면자동 등)                 |                      |        |
| N/A                                  |                      |        |
| 특이사항                                 |                      |        |
| 신규, PR161900                         |                      |        |
| 사용폰트 (일리스트 pt표기)                     |                      |        |
| 타이틀                                  | 8Point(일리)           |        |
| 본문                                   | 7Point(일리)           |        |
| 줄간격                                  | 0.5Point (일리)        |        |
|                                      |                      |        |
| colors                               |                      |        |
|                                      | BLACK                | 1<br>도 |
| N/A                                  | N/A                  |        |
| N/A                                  | N/A                  |        |
| N/A                                  | N/A                  |        |
| 자재코드                                 |                      |        |
| N/A                                  |                      |        |
| 에디션넘버 (E,N)(협력사명)                    |                      |        |
| H00                                  |                      |        |
| 바코드 (13자리)                           |                      |        |
| N/A                                  |                      |        |
| 제조자                                  |                      |        |
| (주)한국비즈니스제약/경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127 |                      |        |
| 제조의뢰자                                |                      |        |
| (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14  |                      |        |
| 판매원                                  |                      |        |
| N/A                                  |                      |        |

대웅제약

# 이지엔6 에이스정

500mg  
(아세트아미노펜)

일반의약품

빠르게 녹아 작용하는 해열진통제, 이지엔6에이스정

이지엔6에이스정은 복용 후 15분\* 만에 통증을 완화하는 아세트아미노펜 500mg 해열진통제입니다.

\* 치통 환자 아세트아미노펜 1,000mg(이지엔6에이스정 2정) 복용 기준, 증상 별로 발현 시간이 상이하게 나타날 수 있습니다.

## 특 장 점

1. 복용 후 15분 이내 빠른 작용<sup>1)</sup>
2. 아세트아미노펜 단일제로 위장장애 부담이 적어 공복 복용 가능<sup>2)</sup>

Ref. 1) Qi DS, et al. *Clin Ther.* 2012;34(12):2247-2258 2) Hoftiezer JW, et al. *Gut.* 1982;23(8):692-697.

## 주 효능·효과

**해열**  
감기로 인해  
열이 나는 분

**두통**  
지끈지끈한 두통으로  
불편함을 겪는 분

**신경통**  
시리고 짜릿한  
통증이 있는 분

## 【효능·효과】

1. **주효능·효과** 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뻘 통증)
2. **다음 질환에도 사용할 수 있습니다.** 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증)

## 【용법·용량】

만 12세 이상 소아 및 성인 : **1회 1~2정씩 1일 3~4회** (4~6시간마다) 필요시 복용합니다.

1일 최대 4g (8 정)을 초과하여 복용하지 않습니다. 이 약은 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용합니다.

## 【원료약품 및 그 분량】 - 1정 중 -

유효성분 : 아세트아미노펜(KP) ..... 500mg  
첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르나우바납, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭실드현색(11W1045), 히드록시프로필셀룰로오스

## 【성상】 흰색의 정방형 필름코팅정제

EAC

## 【사용상의 주의사항】

1. **경고** 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다. 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자분에게서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 홍포증(급성 전신성 발진성 고름물집증(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEPN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자분들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다. 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대용량 (4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량 (4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제들과 함께 복용하여서는 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자분
- 2) 소화성궤양 환자분
- 3) 심한 혈액 이상 환자분
- 4) 심한 간장애 환자분
- 5) 심한 신장(콩팥)장애 환자분
- 6) 심한 심장기능저하 환자분
- 7) 아스피린(천식비스테로이드성 소염항염제에 의한 천식발작 유발) 또는 그 병력이 있는 환자분
- 8) 다음의 약물을 복용한 환자분 : 바르비탈계 약물, 심한계 항우울제
- 9) 알코올을 복용한 사람

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자분
- 2) 신장(콩팥)장애 또는 그 병력이 있는 환자분
- 3) 소화성궤양의 병력이 있는 환자분
- 4) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자분
- 5) 출혈경향이 있는 환자분(혈소판기능이상이나 나타날 수 있습니다.)
- 6) 심장기능이상이나 있는 환자분
- 7) 과민증의 병력이 있는 환자분
- 8) 기린지 천식 환자분
- 9) 고령자(노인)
- 10) 입부 또는 수유부
- 11) 외파린을 장기복용하는 환자분
- 12) 다음의 약물을 복용한 환자분 : 리튬, 타이로제 이노제

4. 다음과 같을 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오, 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 속: 속, 아나필락시양 증상(과민성우식증: 호흡곤란, 온몸이 붉어짐, 혈관부기, 두드러기 등), 천식발작
- 2) 혈액: 혈소판 감소, 과립구감소, 용혈성적혈구 파괴성빈혈, 메트헤모글로빈혈증, 혈소판기능 저하(출혈시 현상), 청색증
- 3) 과민증: 과민증상(얼굴부기, 호흡곤란, 땀이 남, 저열, 입, 속)
- 4) 소화기: 구역, 구토, 식욕 부진, 장기복용시 위장출혈, 소화성궤양, 천공(궤양) 등의 위장관계 이상반응
- 5) 피부: 발진, 알레르기 반응, 피부점막만 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성표피괴사증(리엘 증후군)
- 6) 기타: 장기투여시 만성간괴사, 급성해장(이차)염, 만성간염, 신장(콩팥)독성
- 7) 과량투여: 간장, 신장(콩팥), 심근의 괴사
- 8) 약에 대해 시판 후 조사에서 보고된 추가적 이상반응은 아래 표와 같습니다. 발현빈도는 매우 흔한  $\geq 1/10$ , 흔한  $\geq 1/100$ , 흔하지 않게  $\geq 1/1,000$  및  $\geq 1/100$ , 드물게  $\geq 1/1,000$  및  $\geq 1/1,000$ , 매우 드물게  $\geq 1/10,000$ 입니다.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 면역계 장애            | 매우 드물게: 아나필락시스 반응, 과민증              |
| 피부 및 피부(피부발)조직 장애 | 매우 드물게: 두드러기, 소양성(가려움) 발진, 발진, 고정발진 |

표, 자발적 보고율로부터 추정된 빈도에 따라 이 약의 시판후 경험에서 밝혀진 이상반응

- 9) 국내 부작용 보고자료의 분석평가에 따라 다음의 이상반응을 추가합니다.
- 감당도: AST 상승, ALT 상승 ● 피부: 고정발진

5. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

1) 일반적주의

- (1) 과민증상을 예측하기 위해 충분한 상담을 받아야 합니다.
- (2) 소염(항염) 진통제에 의한 치료는 원인이었는지 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)입니다.
- (3) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다. 가. 장기복용하는 경우 정기적인 임상검사(요사자, 혈액검사, 간기능검사 등)를 받고 이상이 있을 경우 강령(중임), 복용중지 등의 적절한 조치를 해야 합니다. 나. 약물요법 이외의 치료법도 고려합니다. (4) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다. 가. 금식통증 및 발열의 정도를 고려하여 복용합니다. 나. 원칙적으로 동일한 약물의 장기복용은 피합니다. 다. 원인이었는지 있는 경우에는 실시합니다. (5) 소아 및 고령자(노인)는 최소 필요량을 복용하고 이상반응에 유의합니다. 과도한 체온강화, 허탈, 사지냉각 등이 나타날 수 있으므로 특히 고령을 수반하는 소아 및 고령자(노인) 또는 소모성 질환 환자분의 경우, 복용 후의 상태를 충분히 살펴야합니다. (6) 다른 소염(항염)진통제와 함께 복용하는 것은 피합니다. (7) 의사 또는 약사의 지시없이 통증에 10일 이상(성인) 또는 5일 이상(소아) 복용하지 말고 통증에 3일 이상 복용하지 않습니다. 통증이나 발열 증상이 지속되거나 악화될 경우, 또는 새로운 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의합니다. (8) 이 약 복용시 감염증을 걸로 나타나지 않게 할 수 있으므로 감염증이 합병된 환자분의 경우에 의사처방에 따라 적절한 항균제를 함께 복용해야 합니다.

2) 과량투여시의 처치

이 약을 과량복용시 어떠한 명백한 중상이나 징후가 없더라도 신중하게 의학적 처치를 받아야 합니다. 10~12시간 이내에 N-아세틸시스테인 정맥주사를 투여하거나 메치오닌을 경구복용하여 간을 보호해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 밀폐용기, 실온( $1\sim 30^{\circ}\text{C}$ )보관하십시오.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 약의약품의 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품의 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 약품의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

**【저장방법】** 밀폐용기, 실온( $1\sim 30^{\circ}\text{C}$ )보관하십시오.

**【포장단위】** 10정/상자((10정/PTP) $\times$ 1), 30정/병

**【사용기간】** 제조일로부터 36개월입니다.

제조업체: (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제암공단4길 35-14  
 제조자: (주)한곡파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 신안로83번길 127

\* 본 약의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 약품들은 공정거래위원회 고시소비자 분쟁해결기준에 의거 구입한 약국 및 약의약품판매자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

\* 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지([www.daewoong.co.kr](http://www.daewoong.co.kr)) 및 소비자상담 전화번호(080-6500-8306~9)에서 확인할 수 있습니다.

\* 부작용보고 및 피후구제신청 : 한국약물관리안전관리센터(14-3330, 1644-6223)

|        |                      |            |
|--------|----------------------|------------|
| 확<br>인 | 디자인                  | QC (문안)    |
|        | 김관률<br>010-4756-4486 | 이신         |
| 날짜     | 2025.04.21           | 2025.04.21 |



DW PKG 인쇄사양서

|                                     |                      |        |
|-------------------------------------|----------------------|--------|
| product                             |                      |        |
| 제품명                                 | 이지엔6 에이스정 설명서(일반의약품) |        |
| 포장단위                                |                      |        |
| size (장×폭×고)                        |                      |        |
| 155*180mm                           |                      |        |
| 종이재질                                |                      |        |
| 모조70g/m2                            |                      |        |
| 코팅 (CR, 라미레이팅, UV 등)                |                      |        |
| N/A                                 |                      |        |
| 후가공                                 |                      |        |
| N/A                                 |                      |        |
| 접착 (맛투경, 1면, 1면자동 등)                |                      |        |
| N/A                                 |                      |        |
| 특이사항                                |                      |        |
| 신규, PR134542                        |                      |        |
| 사용폰트 (일리스트 pt표기)                    |                      |        |
| 타이틀                                 | 8Point(일리)           |        |
| 본문                                  | 7Point(일리)           |        |
| 줄간격                                 | 0.5Point (일리)        |        |
|                                     |                      |        |
| colors                              |                      |        |
|                                     | BLACK                | 1<br>도 |
| N/A                                 | N/A                  |        |
| N/A                                 | N/A                  |        |
| N/A                                 | N/A                  |        |
| 자재코드                                |                      |        |
| N/A                                 |                      |        |
| 에디션넘버 (E,N)(협력사명)                   |                      |        |
| H00                                 |                      |        |
| 바코드 (13자리)                          |                      |        |
| N/A                                 |                      |        |
| 제조사                                 |                      |        |
| (주)한국피비스제약/경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127 |                      |        |
| 제조의뢰자                               |                      |        |
| (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14 |                      |        |
| 판매원                                 |                      |        |
| N/A                                 |                      |        |

대웅제약

# 이지엔6 에이스정

500mg  
(아세트아미노펜)

일반약품

빠르게 녹아 작용하는 해열진통제, 이지엔6에이스정

이지엔6에이스정은 복용 후 15분\* 만에 통증을 완화하는 아세트아미노펜 500mg 해열진통제입니다.

\* 치통 환자 아세트아미노펜 1,000mg(이지엔6에이스정 2정) 복용 기준, 증상 별로 발현 시간이 상이하게 나타날 수 있습니다.

## 특 장 점

1. 복용 후 15분 이내 빠른 작용<sup>1)</sup>
2. 아세트아미노펜 단일제로 위장장애 부담이 적어 공복 복용 가능<sup>2)</sup>

Ref. 1) Qi DS, et al. *Clin Ther*, 2012;34(12):2247~2258 2) Hottiez JW, et al. *Gut*, 1982;23(8):692~697.

## 주 효능 · 효과

**해열**  
감기로 인해  
열이 나시는 분

**두통**  
지끈지끈한 두통으로  
불편함을 겪는 분

**신경통**  
시리고 짜릿한  
통증이 있으신 분

## 【효능·효과】

1. **주효능·효과** 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뻥통)
2. **다음 질환에도 사용할 수 있습니다.** 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증)

【용법·용량】 만 12세 이상 소아 및 성인 : **1회 1~2장씩 1일 3~4회** (4~6시간마다) 필요시 복용합니다.

1일 최대 4g (8 정)을 초과하여 복용하지 않습니다. 이 약은 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용합니다.

## 【원료약품 및 그 분량】 - 1정 중 -

유효성분 : 아세트아미노펜(KP) ..... 500mg  
첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이퀀색(03B28796), 전분글리콜산나트륨, 카르나우바남,  
크로스카르멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 정방형 필름코팅정제

## 【사용상의 주의사항】

1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다. 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자분에게서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자분들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다. 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대용량 (4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량 (4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제들과 함께 복용하여서는 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자분 2) 소화성궤양 환자분 3) 심한 혈액 이상 환자분 4) 심한 간장애 환자분 5) 심한 신장(콩팥)장애 환자분 6) 심한 심장기능저하 환자분
- 7) 아스피린, 천식(비스테로이드성 소염(항염)제에 의한 천식발작 유발) 또는 그 병력이 있는 환자분 8) 다음의 약물을 복용한 환자분: 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제
- 9) 알코올을 복용한 사람

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자분 2) 신장(콩팥)장애 또는 그 병력이 있는 환자분 3) 소화성궤양의 병력이 있는 환자분 4) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자분
- 5) 출혈경향이 있는 환자분(혈소판기능이상이나 나타날 수 있습니다.) 6) 심장기능이상이나 있는 환자분 7) 과민증의 병력이 있는 환자분 8) 기권지 천식 환자분
- 9) 고령자(노인) 10) 임부 또는 수유부 11) 외파린을 장기복용하는 환자분 12) 다음의 약물을 복용한 환자분: 리튬, 치아치제에 노출제

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오, 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 속: 속, 아나필락시스 증상(과민성응급사상증: 호흡곤란, 오물이 붙어짐, 혈관부기, 두드러기 등), 천식발작 2) 혈액: 혈소판 감소, 과립구감소, 용혈성(적혈구 파괴성)빈혈, 메트헤모글로빈혈증, 혈소판기능 저하(출혈시각인 연장), 청색증 3) 과민증: 과민증상(얼굴부기, 호흡곤란, 땀이 남, 저혈압, 속) 4) 소화기: 구역, 구토, 식욕 부진, 장기복용시 위장출혈, 소화성궤양, 천공(穿孔) 등의 위장관계 이상반응 5) 피부: 발진, 알레르기 반응, 피부점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성표피괴사증후군(레일 증후군)
- 6) 기타: 장기투여시 만성간괴사, 급성해장(이차)염, 만성간염, 신장(콩팥)독성
- 7) 광투여시: 간장, 신장(콩팥), 심근의 괴사 8) 이 약에 대해 시판 후 조사에서 보고된 추가적 이상반응은 아래 표와 같습니다. 발현빈도는 매우 흔히  $\geq 1/10$ , 흔히  $\geq 1/100$  일 때  $1/10$ , 흔하지 않게  $\geq 1/1,000$  일 때  $1/100$ , 드물게  $\geq 1/10,000$  일 때  $1/1,000$ , 매우 드물게  $1/10,000$  일 때  $1/10,000$  일 때,

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 면역계 장애            | 매우 드물게: 아나필락시스 반응, 과민증              |
| 피부 및 피하(피부밑)조직 장애 | 매우 드물게: 두드러기, 소양성(가려움) 발진, 발진, 고정발진 |

표, 자발적 보고율로부터 추정된 빈도에 따른 이 약의 시판후 경험에서 밝혀진 이상반응

- 9) 국내 부작용 보고자료의 분석평가에 따라 다음의 이상반응을 추가합니다.
- 간담도 장애: AST 상승, ALT 상승 ● 피부: 고정발진

5. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

- 1) 일반적주의
  - (1) 과민증상을 예측하기 위해 충분한 상담을 받아야 합니다. (2) 소염(항염) 진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)입니다.
  - (3) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다. 가, 장기복용하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등을) 받고 이상이 있을 경우 감량(줄임), 복용중지 등의 적절한 조치를 해야 합니다. 나, 약물요법 이외의 치료법도 고려합니다. (4) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다. 가, 급성통증 및 발열의 정도를 고려하여 복용합니다. 나, 원칙적으로 동일한 약물의 장기복용은 피합니다. 다, 원인요법이 있는 경우에는 실시합니다. (5) 소아 및 고령자(노인)는 최소 필요량을 복용하고 이상반응에 유의합니다. 과도한 체온강하, 하혈, 사지냉각 등이 나타날 수 있으므로 특히 고열을 수반하는 소아 및 고령자(노인) 또는 소소성 질환 환자분의 경우, 복용 후의 상태를 충분히 살펴야합니다. (6) 다른 소염(항염)진통제와 함께 복용하는 것은 피합니다. (7) 의사 또는 약사의 지시없이 통증에 10일 이상(성인) 또는 5일 이상(소아) 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 않습니다. 통증이나 발열 증상이 지속되거나 악화될 경우, 또는 새로운 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의합니다. (8) 이 약 복용시 감염증을 겹으로 나타내지 않게 할 수 있으므로 감염증이 합병된 환자분의 경우에 의사처방에 따라 적절한 항균제를 함께 복용해야 합니다.
- 2) 광투여시의 처리
 

이 약을 과량복용시 어떠한 명백한 증상이나 징후가 없더라도 신중하게 의학적 처치를 받아야 합니다. 10~12시간 이내에 N-아세틸시스테인 정맥주사를 투여받거나 메치오닌을 경구복용하여 간을 보호해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 밀폐용기, 실온( $1\sim 30^{\circ}\text{C}$ )보관하십시오.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품은 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오염(결로) 사용에 따른 사고 발생이나 약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.