

[색상에 유의하여 인쇄 바랍니다]

디자인 사양	자재명	파누스정240mg_설명서
주의사항 1. JPG 파일(그림파일)이나 PDF파일을 첨부하오니 그림유실, 데이터 오류 등 체크해 주시기 바랍니다. 2. 감리 일자는 일주일 전 협의바랍니다. 3. 감리를 가지 않을 경우 사전에 담당자와 협의하여 사진을 통해 인쇄 상태를 확인 할 수 있어야 합니다. 4. 파일에 문제가 있을 시 임의 변경 하지 마시고 연락 주시기 바랍니다. 5. 인쇄도수에 'P'를 표기한 경우 'PANTONE'을 의미합니다.	최종수정일	2025.01.13
	규격(장폭고)mm	140*160mm
	재질	모조지
	양면여부	단면인쇄
	매뉴얼팩 / 접지 유무	매뉴얼팩 아님 / 접지없음
	비고	-
	문의전화	삼진제약 커뮤니케이션팀 02-3140-0693
인쇄도수		
1도		
	BLACK	

파누스TM 정 240mg

(은행엽건조엑스)

ParnusTM Tab. 240mg

■ 원료약품 및 그 분량: 1정 중

유효성분: 은행엽 건조엑스(EP) 240mg
 첨가제(타르색소): 적색40알루미늄늄레이크, 청색1호알루미늄레이크, 황색203알루미늄레이크
 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(수/유유)
 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이EZ클리어(253J190007), 오파드라이QX녹색(321A610008), 옥수수전분, 콜로이드성 이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 텔크

■ 성상: 녹색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능·효과

집중력저하, 기억력감퇴, 현기증(동맥경화증상)과 같은 증상이 동반되는 정신기능 저하

■ 용법·용량

성인
 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다.
 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
 - 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.
- 임산부
 - 1) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당불내증, 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것
 - 1) 항응고제(예: 펜프로쿰드, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
 - 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약을 니페디딘 및 딜티아졸과 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률이 영향을 미치므로 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있다. 경구용 데오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있다. 따라서 주의감각 모니터링하고 용량을 조절해야 한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 한다.
 - 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
 - 3) 이 약을 복용(사용)하여 간질 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 점부문서를 소지할 것
 - 1) 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
 - 2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월

후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속하도록 다시 확인해야 한다.

3) 이상반응

- 위장 장애: 오심(구역) 등의 위장관 증상.
 - 신경계: 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
 - 피부: 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증).
- 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다.

장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.

4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 어지러움
- 가려움증

5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 포장단위: 100 정/상자(10 정/PTP*10), 30 정/병, 50 정/병, 90 정/병, 500 정/병

■ 제조원: 삼진제약(주) - 경기도 화성시 함평면 제약공단길 52(제조의뢰자) 동림두막(주) - 경기도 화성시 함평면 제약공단3길 120(제조자)

※ 본 정제문서 문안 개정일자(2025년 01월 13일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자번호 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 사용기한이 경과되었거나 변질·변해·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환여도 드립니다.

※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

SAMJIN 삼진제약주식회사