

 에스케이케미칼(주)	
제품정보	
제품명(약제구분)	기넥신메모케어캡슐(일반의약품)
품 목	설명서(단면)
사이즈	180*170mm
재질	
코팅	
수정일자(버전)	2025.02.19 (Ver. 001)
기타 후가공	
사용폰트	
원료의약품	7pt
본문	6.5pt
줄간격	+1.5pt
Colors	
	C
	M
	Y
	K
	칼선(인쇄되지 않습니다.)
• 사이즈 재질 및 색상, 후가공 확인해주세요	
• 전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요	
• 빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 인장공간 위치 확인해주세요	
• 정확한 검토 부탁드립니다.	

생약복합성분 **기억력 감퇴 개선제**

기넥신 메모케어 캡슐

은행염건조엑스 60mg + 인삼40%에탄올건조엑스 100mg

【원료약품 및 그 분량】1캡슐 중

• 유효성분: 인삼40%에탄올건조엑스(생규) 100mg
은행염건조엑스(EP) 60mg

• 첨가제(타르색소): 황색5호, 적색40호, 청색1호
• 동물유래성분: 유당수화물(소-우유)
• 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 합수이산화규소, 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성상】 황갈색의 가루가 들어 있는 오렌지색의 경질캡슐제

【효능·효과】

— 집중력 및 주의력 저하, 기억력감퇴
— 다음과 같은 말초 동맥 순환장애 증상의 개선: 현기증

【용법·용량】

1일 2회(아침, 점심 식사후), 1회 1캡슐을 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿰, 와파린), 항혈소판제(예: 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
- 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나 제품상담전화(080-021-3131)를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mktis.go.kr)'을 참조하십시오.
- 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약물안전관리원에 할 수 있습니다. **신청방법** ☎ 1644-6223, 14-3330/☐ karp.drugsafe.or.kr **신청대상** 의약품부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족 **보상범위** 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비


에스케이케미칼(주)
Life Science Biz.
충청북도 청주시 흥덕구 신단로 149

자세한 문익는 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료)080-021-3131


풍림무약주식회사
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120


제일헬스사이언스
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가청로 7 B동


SK 케미칼

일반의약품

분류번호 : 219

- 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
- 4) 이 약은 적색40호(알라레드AC, Allura Red AC)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 3) 이상반응
 - ① 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 은행염엑스(경구, 단일제) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
 - ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.

【저장방법】 밀폐용기, 상온(15~25℃)보관

【사용기한】 직접용기에 별도표기

【포장단위】 60캡슐/병, 120캡슐/상자(60캡슐/병X2)

주) 이 약은 고혈압치료제가 아니므로 혈압조절이 요구되는 고혈압 환자는 혈압강화 목적으로 본 제제만을 단독 투여하지 마십시오.

2024. 11. 13 작성
(Ver.001)