

칼슘과 비타민 3종 복합제

에드민디에스정


한국피엠지제약
 Pionex Management Group

일반의약품(조제용) 분류번호 : 319

【성분·함량】 1정 중

- 유효성분 : 시트르산칼슘수화물(USP) 475 mg (칼슘으로서 100 mg)
 농축콜레칼시페롤(EP) 10 mg (비타민D로서 1,000 IU)
 : 콜레스테롤(동물유래성분, 건강한 양의 양모지), 젤라틴(동물유래성분, 건강한 소의 가죽)
 메코발라민(KP) 1,000 µg
 폴산(EP) 1,000 µg
- 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 AMB II 갈색(88A565108), 콜로이드성아산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

【성상】 주황색의 타원형 필름코팅정
【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민D의 보급
 - 임신·수유기
 - 발육기
 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

【용법·용량】

성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증 질환), 신장 질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 저먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장 장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 7) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
- 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 4) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 6) 우발적으로 과량복용한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1 ~ 30 ℃)보관
【포장단위】 30정/병, 90정/병, 300정/병
KGMP 적격업소 제품
【제조/의뢰자】 (주)한국피엠지제약 / 경기도 시흥시 경제로 59
【제조사】 동성제약(주) / 충청남도 아산시 둔포면 관대안길 45

 ※ 이 첨부문서 작성일자(2025.02.17) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 병·의원, 약국 및 도매상에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하시기 바랍니다.

※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.