

구분	업체명	제품명	규격(장,고/mm)		색상	접지	지류	평량/두께	비고
설명서	-	징코케이정240밀리그램	138	175	Black	매뉴얼팩	캠퍼스지	-	폴림방향 두출

KGMP 일반의약품 징코케이정 240밀리그램 은행엽건조엑스 KGMP 일반의약품 징코케이정 240밀리그램 은행엽건조엑스 [원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(730.0밀리그램) 중 - 유효성분: 은행엽 건조엑스(EP).....240mg - 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색203호 - 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원 동물: 소, 사용부위: 우유) - 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이EZ클리어(253U190007), 오파드라이QX녹색(321A610008), 옥수수전분, 폴리이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 셀크 [성상] 녹색의 장방형 필름코팅정제 [효능·효과] 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하 [용법·용량] 성인 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용하십시오. 식사와 관계없이 복용할 수 있습니다. [사용상의주의사항] - 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오. - 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자 - 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않습니다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 됩니다. - 임산부 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다. - 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오. - 항응고제(예: 펜프로쿰몬, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 효과가 강화되는 것을 배제할 수 없습니다. - 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있습니다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아젯과 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있습니다. 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있습니다. 따라서 주의감각 모니터링하고 용량을 조절해야 합니다. - 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. - 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 합니다. - 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음) - 이 약을 복용(사용)하여 간질 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없습니다.	- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지 하십시오. - 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단 해야 합니다. - 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 합니다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 합니다. - 이상반응 - 위장 장애: 오심(구역) 등의 위장관 증상. - 신경계: 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란 - 피부: 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증). 알레르기성 쇼크가 있을 수 있습니다. 장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었습니다. - 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다. - 어지러움 - 가려움증 - 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있습니다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다. - 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다. - 저장상의 주의사항 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오. [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [포장단위] 100정/상자(10정/PTP*10), 30정/병, 50정/병, 500정/병 [제품문의] 080-601-0080 ※ 본 제품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 의약품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)의 ‘의약품등 제품정보’란을 통해 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부 문서를 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다. ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오. 개정연월일 : 2025.01.17 [제조외지사] GENUONE SCIENCES 주식회사 뉴원사이언스 세종특별자치시 천의면 산단길 245 [제조사] 풍림무약주식회사 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120 [판매자] pharma science Korea 파마사이언스코리아(주) 서울시 서초구 서초중앙로 52, 7층 KO-2501