

근육통증과 통증을 싹~한번에!

패튼에스정
(클로르족사존 복합제)

허리
통증

어깨
통증

목통증

신경통



8 806604 027724

일반의약품

근육통증과 통증을 싹~한번에!

패튼에스정
(클로르족사존 복합제)

허리
통증

어깨
통증

목통증

신경통

오스틴제약(주)



10정

• 1일 2회
• 1회 1-2정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일(2024.04.01) 이후 변경된 내용은 홈페이지 <https://jeyak.co.kr>이나 소비자상담실(080-010-5510)로 문의 또는 식품의약품안전처의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 개정일 : 2024.04.01 Rev.00

오스틴제약(주)
장기간의 임상시험을 통해 안전성과 유효성을 입증한 제품입니다.

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】	1정 중
클로르족사존(KP)	150.0mg
에텐자미드(KP)	150.0mg
카페인수화물(KP)(카페인으로서 22.87 mg)	25.0mg

【효능·효과】 신경통, 요통(허리통), 어깨결림

【용법·용량】

성인 1회 1-2정 1일 2회 통증(통증) 또는 발작시에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염 (코염), 편도염, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람. 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으키는) 적이 있는 사람. 3) 소수 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(정맥)에 유아 및 어린이(14세 이하). 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람. 몸이 약한 사람. 또는 고령이 있는 사람. 5) 고령자(노인). 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인. 수유부. 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

2. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

1) 용법 용량을 잘 지킬 것. 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것. - 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

1) 복용하는 동안 발진, 발적(홍열)이 나타나면, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 2) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 3) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것.

4. 보관 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10정/피티피 【사용기한】 용기 측면 표시일까지

【첨가제】

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분, 글리콜산나트륨, 말크, 폴리메틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 약품 판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

개정일자(2024.01.31)

108mm