

징코린포정

240밀리그램

은행엽건조엑스

DK200625 **등광제약**

인지기능 개선제

징코린포정 240밀리그램

은행엽건조엑스 Ginkgolinför Tab. 240mg

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중

유효성분 : 은행엽 건조엑스(생규) 240mg

첨가제(타르색소) : 청색 1호 알루미눔레이크, 황색 203호 알루미눔레이크

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소-우유)

기타 첨가제 : D-만니톨, 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카르멜로오스나트륨, 탈크, 톱철드녹색(99G1033)

■ 성상 : 녹색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능·효과 : 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증 (동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

■ 용법·용량 : 은행엽건조엑스로서 1회 240 mg, 1일 1회 1정 복용한다. 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
- 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 된다.

3) 임신부

- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 항응고제(예 : 펜프로쿰, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
- 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아젬과 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있다. 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 한다.
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3) 이 약을 복용(사용)하여 뇌전증 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.

2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.

3) 이상반응

• 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.

• 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란

• 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예 : 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증). 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다.
장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.

4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상 사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

• 어지러움

• 가려움증

5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로서 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

5. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ **저장방법** : 기밀용기, 상온(15~25℃)보관

■ **포장단위** : 30정/병, 300정/병

● 이 첨부문서 작성일자 2025년 6월 20일 이후 변경된 내용은 **의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)** 또는 **동광홈페이지 : www.dkphm.com**에서 확인할 수 있습니다.

● 의약품 사용 후 부작용 발생 시, **부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국약품안전관리원**에 할 수 있습니다.

- 신청방법 : ☎1644-6223, 14-3330 / karp.drugsafe.or.kr

- 신청대상 : 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

- 보상범위 : 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

● 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

● **수신자부담 소비자 상담실 : 080-776-1472**

제조의회사

 **동광제약주식회사**

경기도 평택시 산단로 115

제조사

COSMAX  **PHARMA**

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

충북 제천시 바이오밸리3로 30

KGMP적격업체제품

본 제품은 우수약품제조관리기준에
적합하게 제조되었습니다.

DK200625