

고함량 콘드로이틴 + 칼슘&마그네슘&비타민D

조인트리치**800정** 콘드로이틴 800mg칼슘/마그네슘/비타민D
활성비타민B군
항산화성분/UDCA

【원료약품 및 분량】 1정 중

*유효성분

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	800 mg
벤포티아민(티아민염산염으로 36.15 mg) (KP)	50 mg
니코틴산아미드(KP)	10 mg
피리독신염산염(KP)	30 mg
토코페롤아세테이트 2배산(EP)(비타민E로서 10IU)	20 mg
판토텐산칼슘(KP)	10 mg
메코발라민(KP)	1 mg
농축콜레칼시페롤 산(EP)(비타민D로서 1000IU)	10 mg
아스코르브산97%과립(별규)(아스코르브산으로서 50mg)	51.55 mg
침강탄산칼슘(KP)(칼슘으로서 18.0mg)	45 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 18.1mg)	30 mg
우르소데옥시콜산(KP)	10 mg

*첨가제 : 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 탈실드갈색(99B703)

【성상】 적갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 B1, B6, B12, C, D, E의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

• **비타민B1(벤포티아민)**

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
- 각기
- 노인피로

• **비타민C(아스코르브산97%과립)**

- 해열 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방

• **비타민 D(농축콜레칼시페롤 산)**

- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

• **비타민 E(토코페롤아세테이트2배산)**

- 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)

【용법·용량】 만 19세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 4) 심장순환 기계기능 장애 환자
- 5) 신장(콩팥)장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 감시 배당체를 투여 중인 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 9) 신장결석 병력이 있는 환자
- 10) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 붉은변, 식욕부진, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은반점, 부진수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 흥분, 두드러기, 숨진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종-수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다
- 6) 홀산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다
- 10) 항일도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 11) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담실】 080-260-0033

【판매원】 (주)녹십자/충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 586

【제조원】 성이바이오제약 주식회사/강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 2층, 3층

※ 의약품 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염 및 손상된 제품은 구입처에서 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명, 의약품 허가 변경사항 등 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 부작용 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)